Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi”, Bergamo, vol. 38, 2025, pp. 47-69 ISSN 0393-8700

Paolo PANTINI & Michele CARIA

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEGLI GNAPHOSIDAE (ARANEAE) ITALIANI

RIASSUNTO – Il lavoro riporta i risultati emersi dallo studio degli esemplari della famiglia Gnaphosidae conservati al Museo di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo. Sono state identificate 78 specie per le quali vengono fornite segnalazioni inedite, per 67 specie vi sono nuove segnalazioni a livello regionale. Vengono segnalate per la prima volta per il territorio italiano *Haplodrassus dentifer* Bosmans & Abrous, 2018, *Marinarozelotes ponticus* Ponomarev, 2022, *Trichothyse poonaensis* (Tikader, 1982) e *Talanites strandi* Spassky, 1940 portando a 179 le specie di Gnaphosidae attualmente note per l’Italia.

ABSTRACT – *Contribution to the knowledge of the Italian Gnaphosidae (Araneae)*.
This study presents the results of the examination of Gnaphosidae specimens preserved in the collections of the Museo di Scienze Naturali “E. Caffi” of Bergamo. A total of 78 species were identified, for which new faunistic records are provided. Among these, 67 species represent new regional records. Four species are reported from Italy for the first time: *Haplodrassus dentifer* Bosmans & Abrous, 2018, *Marinarozelotes ponticus* Ponomarev, 2022, *Trichothyse poonaensis* (Tikader, 1982), and *Talanites strandi* Spassky, 1940. With these additions, the total number of Gnaphosidae species currently known from Italy is increased to 179.

KEY WORDS: spiders, faunistic, Italy, new records.

INTRODUZIONE

La famiglia Gnaphosidae Banks, 1892 è una delle famiglie di Araneae più numerose a livello mondiale con 153 generi e 2.500 specie descritte (World Spider Catalog, 2025). La famiglia comprende perlopiù specie di abitudini notturne che si muovono sul terreno e dall’aspetto generalmente poco appariscente, si trovano negli ambienti più disparati e sono presenti praticamente in tutto il mondo. In Italia la famiglia è segnalata con 31 generi e 175 specie, i generi con il maggior numero di specie sono *Zelotes* (41), *Gnaphosa* (21), *Micaria* (18), *Haplodrassus* (16) e *Drassodes* (12) che insieme contano più del 60% delle specie di gnafosidi note per il nostro Paese (Isaia *et al.*, 2025).
I dati sulla presenza dei gnafosidi in Italia sono sintetizzati nel catalogo Araneae.it (Isaia *et al.*, 2025) e sono frutto dell’analisi di oltre 300 articoli, di cui solo pochi sono dedicati nello specifico allo studio e alla conoscenza degli Gnaphodidae italiani. Tra questi ricordiamo i due contributi di Paolo Marcello Brignoli (Brignoli & Gaddini, 1979; Brignoli & Murphy, 1984) e i lavori dell’aracnologa siciliana Francesca Di Franco pubblicati dalla metà degli anni ’80 ai primi anni 2000. Nel caso di questi ultimi si tratta in parte di contributi di carattere faunistico riguardanti la Sicilia (Di Franco, 1986, 1993, 1995, 1998b, 2001) il Lazio (1992, 1996, 1997, 1998a) e l’Isola di Capraia (Di Franco & Pantini, 2000) e in parte di lavori di natura tassonomica (Di Franco, 1988, 1989, 2002; Platnick & Di Franco, 1992).
Scopo del presente contributo è fornire nuovi elementi di conoscenza sulla presenza dei Gnaphosidae in Italia ottenuti grazie allo studio del materiale araneologico conservato nelle collezioni del Museo di Scienze Naturali di Bergamo.

MATERIALI E METODI

Il materiale è conservato nella collezione del Museo di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo in alcol al 70% all’interno di provette di vetro contenenti anche i cartellini con i dati di identificazione e di raccolta. Gli esemplari sono stati determinati utilizzando principalmente il sito Spiders of Europe (Nentwig *et al*., 2025) e per i taxa più complessi lavori specialistici e il confronto con materiale determinato presente in collezione. Per l’osservazione è stato utilizzato uno stereomicroscopio Optika SZM-T 45×, mentre le fotografie sono stati realizzate utilizzando una Optika B3 digital camera.

ELENCO DELLE SPECIE

Di seguito viene riportato in ordine alfabetico l’elenco delle specie secondo la nomenclatura utilizzata dal World Spider Catalog (2025). Per ciascuna specie viene riportato l’elenco del materiale esaminato, per ogni località di

raccolta è stata riportata la regione, la provincia, quando disponibile il comune, le coordinate geografiche, la quota, l'ambiente, il metodo e la data di raccolta, il numero e il sesso degli esemplari e infine il nome del raccoglitore. Viene poi indicata la distribuzione globale secondo Nentwig *et al.* (2025). Vengono infine fornite delle brevi note faunistiche o tassonomiche mentre per la distribuzione italiana delle specie e i relativi riferimenti bibliografici si è fatto riferimento a quanto riportato in Aranae.it (Isaia *et al.*, 2025).

Famiglia Gnaphosidae Banks, 1892

Anagraphis ochracea (L. Koch, 1867)

Puglia: Brindisi: Brindisi, Torre Guaceto, 2 m, canneto, pitfall traps, 4.VII.2007, 1♂, Mastropasqua & Benedetto legerunt.

Distribuzione. Italia, Albania, Macedonia del Nord, Grecia, Turchia.

Note. Specie nota di poche località di Sardegna, Lazio, Puglia e Sicilia.

Aphantaulax trifasciata trifasciata (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Toscana: Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, Sei Busi, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 2.VII.1987, 1♂; *ibidem*, 2.VII.1988, 1♂ (tutti Cenzi P. legit).

Distribuzione. Europa meridionale, Nord Africa, Turchia, Caucaso, Russia (Europa) fino all'Asia centrale, Israele, Iran, Cina, Giappone.

Note. Specie nota con segnalazioni sporadiche in Italia settentrionale, peninsulare e nelle isole maggiori.

Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Basilicata: Matera: Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069 N 16,189422E, 800 m, macchia mediterranea, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Soldato G. legit.

Sicilia: Messina: Lipari, Isole Eolie, Stromboli, 200 m, 6.V.2011, 1♀, Isaia M. legit.

Distribuzione. Africa occidentale, dal Mediterraneo all'Asia centrale, Iran, Afghanistan, Myanmar.

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Toscana, Marche, Puglia, Calabria e Sicilia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Callilepis schuszteri (Herman, 1879)

Basilicata: Potenza: Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● San Severino Lucano, Madonna del Pollino, 1500 m, 9.VI.1991, 1♂, Valle M. leg. ● Viggianello, 9.VI.1989, 1♀, Valle M. legit.

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Cina, Corea, Giappone.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Campania.

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866)

Veneto: Padova: Baone, 45,25855N 11,68905E, 100 m, vigneto biologico, pitfall traps, 29.VI-10.VII.2020, 1♂; *ibidem*, 10-22.VII.2020, 1♀ (tutti Trespidi G. & Turetta A. leg.); 45,25826N 11,68847 E, 60 m, vigneto convenzionale, pitfall traps, 29.VI-10.VII.2020, 9♂♂ 8♀♀; *ibidem*, 10-22.VII.2020, 5♂♂ 6♀♀ (tutti Trespidi G. & Turetta A. legerunt).

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Kazakistan, Iran, Asia centrale, Cina.

Note. Specie nota in Italia di due sole località in Alto Adige (Noflatscher, 1993) e Lombardia (Ciocca & Pantini, 2011). La citazione di Toscana (di Caporiacco, 1936) basata su una femmina immatura è dubbia. Nuova segnalazione per il Veneto.

Civizelotes dentatidens (Simon, 1914)

Toscana: Grosseto: Grosseto, Alberese, Parco naturale della Maremma, Azienda Agricola Sei Busi, 42,6349N 11,1189E, 2.VI.1988, 2♂♂, Cenzi P. legit.

Distribuzione. Spagna, Francia, Italia.

Note. Specie nota di poche località di Toscana e Sardegna.

Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943)

Basilicata: Potenza: Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 4♂♂ 2♀♀, Borghesio L. legit.

Friuli-Venezia Giulia: Udine: San Giovanni al Natisone, 45,997581N 13,413656E, m 120, vigneto, pitfall traps, 23.V-6.VI.2017, 4♂♂, Lami F. leg. (in Lami *et al.*, 2020 sub *C. gracilis*) ● Manzano, 46,005993N 13,412475E, m 136, vigneto, pitfall traps, 23.V-6.VI.2017, 2♂♂, Lami F. leg. (in Lami *et al.*, 2020 sub *C. gracilis*).

Marche: Ascoli Piceno: Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790-1000 m, bosco di carpino nero, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 3♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 2♂♂; *ibidem*, prateria stabile, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♂1♀; *ibidem*, prato falciato, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♀ (tutti Rismondo M. & Fabbri R. leg.) ● Macerata: Sarnano, Colle, 550 m, incolto, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 2♂♂ 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.

Distribuzione. Dall'Europa al Kazakistan.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte e Lazio. Nuova segnalazione per le Marche e la Basilicata. Gli esemplari corrispondono alle descrizioni di Miller (1967), Grimm (1985) e Esyunin & Tuneva (2020). Tuttavia gli autori basano le osservazioni delle piccole differenze tra le due specie su esemplari di *C. gracilis* provenienti dalla Slovacchia meridionale, vicino a Sturovo e dal monte Kobyla, vicino a Bratislava nel caso di Miller (1967: 269) e nel caso di Grimm (1985: 283) dall'Austria orientale (Niederösterreich, Wiener Neustadt e Burgenland, Apetlon). Sembra strano che tutti gli esemplari italiani corrispondano a *C. pygmaeus,* riteniamo che sarebbe opportuno verificare la vera identità di *C. gracilis,* descritto da Canestrini (1968) su esemplari

del Modenese, confrontando il tipo conservato a Padova o esaminando esemplari provenienti dalla località tipica.

Civizelotes solstitialis (Levy, 1998)

Sicilia: Siracusa: Noto, Agricamping Maccari, 36,7644N 15,0734E, 25 m, 3.VIII.2018, 1♂ 1♀, Pantini P. legit.

Distribuzione. Italia (Sardegna), Bulgaria, Grecia, Turchia, Cipro, Israele, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Pakistan.

Note. Nota di una sola località di Sardegna. Nuova segnalazione per la Sicilia.

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

Abruzzo: Teramo: Pineto, dune, 4.III-17.VII.1998, 1♀; *ibidem*, 5-23.V.1998, 1♀; *ibidem*, 5.VI.1998, 2♂♂; *ibidem*, 5-6.VI.1998, 3♂♂; *ibidem*, 4-6.VII.1998, 1♂ 2♀♀; *ibidem*, 4-17.VII.1998, 1♀; *ibidem*, 6-17.VII.1998, 4♀♀; *ibidem*, 1-5.VIII.1998, 2♀♀; *ibidem*, 1-6.VIII.1998, 4♀♀; *ibidem*, 1998, 1♀; *ibidem*, 7-22.V.1999, 1♂ (tutti Di Febo T. leg.) ● Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, prateria, 4.VII-30.VIII.2007, 1♀, Fabbri R. legit.

Distribuzione. Azzorre, Europa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Israele, Iran, Asia centrale, Cina, Corea, Giappone.

Note. Con le presenti segnalazioni la specie risulta ora nota di tutte le regioni italiane.

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

Basilicata: Potenza: Grumento Nova, 40,31N 15,83E, 560 m, frutteto, pitfall traps, VI.2014, 1♀; *ibidem*, VII-X.2014, 2♀♀ ● Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 1.VII.2013, 1♂ ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 4♂♂, Borghesio L. leg. ● Pietrapertosa, 4-5 km S, 40,476306N 16,062621E, 1086 m, prato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Viggiano, 40,31N 15,9E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 11.IX.2014, 1♀.

Emilia-Romagna: Ferrara: Mesola, Bosco della Mesola, Elciola, slm, lecceta, pitfall traps, 11.V-10-VI.1996, 1♂1♀, Fabbri R. leg. ● Forlì-Cesena: Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Corniolo, Pian del Grado, 43,89N 11,72E, 780 m, bosco, 5.VIII.1997, 1♀, Scaravelli D. & Bertozzi M. leg. ● Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Il Sasso, 815 m, sopra bosco ripariale, 28.VIII.1997, 1♀, Bertozzi M. leg. ● Piacenza: Bobbio, Monte Penice, 1450 m, 20.V.2001, 1♀, Magnati F. & Pantini P. leg. ● Bobbio, strada per Monte Penice, 1400 m, margine strada, 20.VI.2001, 5♀♀, Ferrario E., Lodovici O. & Pantini P. leg.; *ibidem*, pitfall traps, 20.VI-31.VII.2001, 1♀; *ibidem*, 31.VII.2001, 1♀; *ibidem*, 26.IV-27.VI.2002, 3♂♂ (tutti Pantini P. leg.) ● Ravenna: Mezzano, vasche dell'ex zuccherificio, pitfall traps, 7.V-27.V.2006, 1♀, Fabbri R. & Pezzi G. legerunt.

Marche: Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, prateria stabile, pitfall traps, 27.VII-1.IX.2004, 1♀; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 1♀ (tutti Rismondo M. & Fabbri R. leg.) ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, bosco di carpino nero, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♂, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Macerata: Sarnano, Colle, 550 m, incolto, pitfall traps, 27.VII-1.IX.2004, 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.

Distribuzione. Europa, Turchia, Israele, Caucaso, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Iran, Asia centrale, Cina, Giappone.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Sicilia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Drassodes villosus (Thorell, 1856)

Lombardia: Lecco: Casargo, Val Marcia, Valle Foppone, 1600 m, pascolo, pitfall traps, 19.VI-20.VII.2009, 1♂ 1♀, Massaro M. & Zucchelli W. legerunt.

Distribuzione. Europa, Turchia, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Iran, Asia Centrale.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Drassodex drescoi Hervé, Roberts & Murphy, 2009

Piemonte: Biella: Biella, Lago del Mucrone, 1900 m, 31.VII.2004, 1♀, Giachino P. M. leg. ● Biella, Monte Camino, 2200 m, 23.VII.2005, 4♀♀, Pantini P. legit.

Distribuzione. Francia, Svizzera, Italia.

Note. Specie endemica delle Alpi Occidentali. Nota di poche località di Piemonte e Valle d'Aosta. In figura 1 sono riportate le immagini dei genitali femminili.

Drassodex hypocrita (Simon, 1878)

Liguria: Genova: Montoggio, Fontana Fredda superiore, 500 m, 21.XII.2001, 1♂, Raineri V. & Valle M. leg. ● La Spezia: Bonassola, tra Framura e Bonassola, 80 m, 9.III.2003, 1♀, Pantini P. leg. ● Varese Ligure, Passo Cento Croci, 1000 m, 17.V.1950, 1♀, di Caporiacco L. & Valle A. legerunt.

Distribuzione. Europa, Turchia.

Note. Specie nota di poche località di Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Sardegna. Nuova segnalazione per la Liguria.

Drassodex validior (Simon, 1914)

Emilia-Romagna: Piacenza: Bobbio, strada per Monte Penice, 1400 m, 31.VII.2001, 2♂♂ 3♀♀, Facheris D., Ferrario E., Bianchi L. & Pantini P. legerunt.

Distribuzione. Francia, Italia.

Note. Specie nota di una sola località nelle Alpi Marittime (Isaia *et al.*, 2014). Nuova segnalazione per l'Emilia-Romagna. Nelle figure 2 e 3 sono riportate le immagini dei genitali maschili e femminili.

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

Basilicata: Potenza: Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Corleto Perticara, 4-5 km S lungo la SS 92, 40,350399N 16,053165E, 757 m, bosco, pitfall traps,



Fig. 1. *Drassodes drescoi,* femmina a) epiginio in visione ventrale, b) vulva in visione dorsale. Barra di scala 0,5 mm.



Fig. 2. *Drassodex validior*, palpo sinistro del maschio. a) visione ventrale, b) visione retrolaterale. Barra di scala 0,5 mm.



Fig. 3. *Drassodex validior*, femmina a) epiginio in visione ventrale, b) vulva in visione dorsale. Barra di scala 0,5 mm.

17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Grumento Nova, 40,31N 15,83E, 560 m, frutteto, pitfall traps, 1.VII.2013, 1♂ ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂, Borghesio L. leg. ● Laurenzana, ca 3 km a E, 40,466812N 15,999512E, 850 m, prato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Viggiano, 40,31N 15,9E, 600 m, frutteto, pitfall traps, VI.2014, 1♂.

Emilia-Romagna: Ferrara: Mesola, Bosco della Mesola, Elciola, slm, lecceta, pitfall traps, 11.V-10.VI.1996, 2♂♂; *ibidem*, radura, pitfall traps, 10.VI-11.VII.1996, 1♀; *ibidem*, 11.VII-13.VIII.1996, 2♀♀ (tutti Fabbri R. leg.) ● Forlì-Cesena: Premilcuore, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Casa i Piani, 43,93N 11,78E, 730 m, prato termofilo, pitfall traps, 31.VII.1997, 1♂, Bertozzi M. leg. ● Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Corniolo, Pian del Grado, 43,89N 11,72E, 780 m, bosco, 5.VIII.1997, 1♀, Scaravelli D. & Bertozzi M. leg. ● Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Corniolo-Campigna, S. Paolo in Alpe, 11,79N 43,87E, 1020 m, prato, 27.VIII.1997, 1♀, Scaravelli D. & Bertozzi M. leg. ● Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Il Sasso, 815 m, sopra bosco ripariale, pitfall traps, 28.VIII.1997, 1♀, Bertozzi M. leg. ● Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, bosco termofilo, pitfall traps, 25.V-21.VI.2000, 1♂, Fabbri R. legit.

Marche: Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, prateria stabile, pitfall traps, 1.IX-7.X.2004, 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, bosco di carpio nero, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Macerata: Fiuminata, Passo Cornello, 800 m, 6.XII.1991, 3♂♂ 6♀♀, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. leg. ● Sarnano, Colle, 550 m, incolto, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 6♂♂ 6♀♀, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.

Distribuzione. Dall'Europa all'Asia centrale.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Calabria. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Drassyllus pumilus (C.L. Koch, 1839)

Basilicata: Potenza: Missanello, lungo fiume Agri (via Saurina), 40,337491N 16,174729E, 640 m, greto, pitfall traps, 27.IV-17.V. 2017,1♂ 1♀, Borghesio L. legit.

Distribuzione. Dall'Europa all'Asia centrale.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)

Basilicata: Matera: Tricarico, bosco latifoglie, 11.VI.2017, 2♀♀, Borio L. leg. ● Potenza: Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 7.V. 2014, 2♂♂ ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 27.IV-17.V. 2017, 2♂♂, Borghesio L. legit.

Emilia-Romagna: Piacenza, Bobbio, strada per Monte Peni-

ce, 1400 m, margine strada, pitfall traps, 26.IV-27.VI.2002, 1♂, Pantini P. legit.

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Iran, Asia centrale, Cina.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Drassyllus villicus (Thorell, 1875)

Basilicata: Matera: Accettura, tra Stigliano e Accentura lungo SP 277 stazione 25 linea 4, 40,434122 N 16,167005E, 770 m, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 1♂ 1♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 17♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 25♂♂ 21♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Aliano, lungo lato sinistro del fiume Agri, 40,339233N 16,215045E, 555 m, prato, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂, Borghesio L. legit ● Cirigliano, dint. NW, 40,401907N 16,157528E, 656 m, bosco, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 3♂♂ 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 2♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Gorgoglione, 4-5 km S, 40,366272N 16,176068E, 800 m, bosco, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 9♂♂ 3♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ 4♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Stigliano, dint. NW lungo la SP 103, 40,416078N 16,198855E, 909 m, bosco, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 19♂♂ 3♀♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 11♂♂ 6♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 19♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Potenza: Castelmezzano, ca 4 km SW, 40,50138N 16,019227E, 750 m, bosco, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 1♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N, 16,026025, 757 m, bosco, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 4♂♂ 1♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 10♂♂ 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 3♂♂ 4♀♀; *ibidem*, pascolo, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 10♂♂ 3♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, 4-5 km S lungo la SS 92, 40,350399N 16,053165E, 757 m, bosco, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂ 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 5♂♂ 4♀♀, (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, dint. S, 40,368992N 16,034014E, 757 m, bosco, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 2♂♂, *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 2♂♂; *ibidem*, 17.V-11.IV.2017, 1♂ 4♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, bosco, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 4♂♂ 3♀♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 8♂♂ 9♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 11♂♂ 21♀♀ (tutti Soldato G. leg.) ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Laurenzana, ca 3 km a E, 40,466812N 15,999512E, 850 m, prato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♀, Borghesio L. leg. ● Pietrapertosa, bosco di latifoglie, 17.V.2017, 2♂♂, Borio L. leg. 4-5 km S, 40,476306N 16,062621E, 1086 m, prato, pitfall traps, 17.V.2017, 1♂, Borghesio L. legit.

Emilia-Romagna: Ferrara: Mesola, Bosco della Mesola, Elciola, slm, lecceta, pitfall traps, 11.VII-13.VIII.1996, 1♀, Fabbri R. leg. ● Mesola, Bosco della Mesola, Panfilia, slm, bosco, pitfall traps, 17.IV-11.V.1996, 2♂♂, Fabbri R. leg. 13.VIII-18.IX.1996, 1♂, Fabbri R. leg. ● Mesola, Bosco della Mesola, Parco della Duchessa, slm, lecceta, pitfall traps, 20.VII-31.VIII.1995, 2♀♀; *ibidem*, 11.V-10.VI.1996, 2♂♂; *ibidem*, 13.VIII-18.IX.1996, 1♀ (tutti Fabbri R. leg.) ● Forlì-Cesena: Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Corniolo, Pian del Grado, 43,89N 11,72E, 780 m, bosco, 5.VIII.1887, 1♀, Scaravelli D. & Bertozzi M. leg. ● Modena: Prignano sulla Secchia, loc. La Quercia, 400 m, pitfall traps, 5.VII-18.VII. 2006, 1♀, Fabbri R. leg. ● Parma: Parma, 60 m, letamaio, 4.III.1950, 1♀, Valle A. leg. ● Ravenna: Riolo Terme, IT407001 Vena del Gesso Romagnola, Monte Mauro, loc. Pedreto, 44,23976N 11,68785E, 345 m, bosco ceduo, pitfall traps, 11.IV-15.V.2020, 7♂♂; *ibidem*, 15.V-11.VII.2020, 1♂ 1♀; *ibidem*, 11.VII-13.VIII.2020, 1♀; *ibidem*, 13.VIII-18.X.2020, 1♀; *ibidem*, bosco, pitfall traps, 31.III-29.IV.2023, 1♀; *ibidem*, 29.IV-5.VII.2023, 5♂♂ 6♀♀; *ibidem*, 5.VII-18.VIII.2023, 5♀♀ (tutti Fabbri R. leg.) ● Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, calanco, pitfall traps, 20.IV-25.V.2000, 1♂, Fabbri R. legit.

Distribuzione. Europa, Turchia, Azerbaigian.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Molise e Puglia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Echemus angustifrons (Westring, 1861)

Abruzzo: L'Aquila: Capestrano, Gran Sasso, Forca di Penne, 800 m, lecceta extrazonale, pitfall traps, 27.VII.2002, 1♂, Marotta O. legit.

Basilicata: Potenza: Viggianello, Torno, 650 m, VI.1990-VI.1991, 1♀, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. legerunt.

Marche: Ascoli Piceno: Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, prato falciato, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♂, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Macerata: Castelsantangelo sul Nera, sopra Rapegna VI-XII.1991, 1♂, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. legerunt.

Toscana: Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 2.VI.1988, 1♀, Cenzi P. legit.

Veneto: Padova: Cinto Euganeo, 45,24573N 11,67333E, 160 m, vigneto biologico, pitfall traps, 10.VII-22.VII.2020, 1♀, Trespidi G. & Turetta A. leg. ● Vo', 45,340731N 11,70233E, 160 m, vigneto biologico, pitfall traps, 29.VI-10.VII.2020, 1♂, Trespidi G. & Turetta A. legerunt.

Distribuzione. Dall'Europa all'Asia centrale.

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Alto Adige, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lazio e Sicilia. Nuova segnalazione per Toscana, Marche, Abruzzo e Basilicata.

Gnaphosa alacris Simon, 1878

Abruzzo: Teramo: Roseto degli Abruzzi, Mazzarosa, torr. Borsacchio, alveo, pitfall traps, 4.VII-30.VIII.2007, 1♂, Fabbri R. leg. ● Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, prateria, pitfall traps, 4.VII-30.VIII.2007, 1♂, Fabbri R. legit.

Basilicata: Potenza: Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, bosco, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, VII.2012-X.2014, 1♂ ● Grumento Nova, lago dell'Aquila, 40,29N 15,81E 834 m, frutteto, pitfall traps, 5.VIII.2013, 1♂ ● Marsicovetere, 40,34N 15,82E 580 m, frutteto, pitfall traps, IV.2013, 1♂ ● *ibidem*, VII.2012-X.2014, 1♂.

Toscana: Firenze: Fiesole: loc. Girone, Fattoria Poggio Piano, 43,4637N 11,2058E, 150 m, vigneto pitfall traps,

23-29.VI.2014, 9♂♂ 7♀♀, Masoni A. leg. ● Montespertoli, Agricampeggio Cipollatico, 43,6802N 11,1119E, m 140, vigneto, pitfall traps, 7-13.VII.2014, 1♂ 5♀♀, Masoni A. leg. ● Rignano sull'Arno, Castello di Volognano, 43,7577N 11,4486E, m 300, vigneto, pitfall traps, 16-22.VI.2014, 22♂♂ 8♀♀, Masoni A. leg. ● Rignano sull'Arno, Fattoria Petriolo, 43,4417N 11,2620E, 300 m, vigneto, pitfall traps, 16-22.VI.2014, 4♂♂, Masoni A. leg. ● Scandicci, Fattoria San Michele a Torri, 45,4638N 11,4012E, 170 m, vigneto, pitfall traps, 1-6.VII.2014, 2♂♂, Masoni A. leg. ● Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 2.VII.1987, 33♂♂ 7♀♀; *ibidem*, 23.VII.1987, 5♂♂ 7♀♀ (tutti Cenzi P. legit).

Distribuzione. Marocco, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Croazia.

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per Abruzzo e Basilicata.

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)

Piemonte: Torino: Parco Nazionale Gran Paradiso, Valle Orco, Gran Piano, 1230 m, pitfall traps, 26.VI.2018, 1♀, PNGP legit.

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa alla Siberia occidentale).

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia, Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Calabria e Sardegna.

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

Abruzzo: Teramo: Roseto degli Abruzzi, Mazzarosa, torr. Borsacchio, bosco, pitfall traps, 11.VI-3.VII.2007, 1♂, Fabbri R. legit.

Basilicata: Potenza: Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26 N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 1.VII.2013, 1♀; *ibidem*, 20.X.2013, 1♀; *ibidem*, VI.2014, 5♂♂; *ibidem*, 8.VIII.2014, 1♀.

Emilia-Romagna: Modena: Prignano sulla Secchia, loc. La Quercia, 400 m, pitfall traps, 5.VII-18.VII.2006, 2♀♀, Fabbri R. leg. ● Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, bosco termofilo, pitfall traps, 2♂♂, Fabbri R. leg. ● Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, calanco, pitfall traps, 21.VI-21.VII.2000, 1♀, Fabbri R. leg.; *ibidem*, 24.VIII.2000, 1♀ (tutti Fabbri R. leg.).

Marche: Ancona, Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 2.VI-17.VI.2003, 1♂; *ibidem*, 17.VI-4.VII.2003, 2♂♂; *ibidem*, 4.VII-23.VII.2003, 1♂ (tutti Rismondo M. & Taffetani F. leg.).

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Iran, Russia (dall'Europa alla Siberia meridionale), Kazakistan, Cina.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per Abruzzo e Basilicata.

Gnaphosa lugubris (C.L. Koch, 1839)

Basilicata: Potenza: Chiaromonte, Piano Toscano, 1750 m, 2.VI.1991, 3♀♀, Ghilardi E., Pantini P. & Valle M. legerunt.

Distribuzione. Dall'Europa all'Asia centrale.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sardegna. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Gnaphosa modestior Kulczynski, 1897

Basilicata: Matera: Stigliano, dint. NW lungo la SP 103, 40,416078N 16,198855E, 909 m, bosco, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ (tutti Borghesio L. leg.) ● Potenza: Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, 27.IV-17.V. 2017, 3♂♂, Borghesio L. legit.

Lombardia: Pavia: Vigevano, Parco del Ticino, Bosco della Lite, m 73, VIII.2001, 2♀♀, Giordano V. & Lazzarini M. leg. (Bogliani *et al.*, 2003 sub *Gnaphosa alpica* cfr.; Isaia *et al.*, 2007 sub *Gnaphosa alpica*).

Distribuzione. Italia, Austria, Repubblica Ceca fino a Romania, Grecia.

Note. Specie nota di poche località di Lombardia, Piemonte e Calabria. Nuova segnalazione per la Basilicata. Le due femmine di Pavia sono state erroneamente pubblicate come *G. alpica*.

Gnaphosa rhenana Müller & Schenkel, 1895

Basilicata: Potenza: Missanello, lungo fiume Agri (via Saurina), 40,337491N 16,174729E, 640 m, greto, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 1♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 2♂♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♀ (tutti Borghesio L. leg.).

Distribuzione. Francia, Svizzera, Germania, Austria, Italia, Romania, Albania.

Note. Specie nota di poche località di Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Liguria. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)

Abruzzo: Teramo: Pineto, slm, dune, pitfall traps, 1998-1999, 1♂ 1♀, Di Febo T. legit.

Basilicata: Matera: Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069N 16,189422E, 800 m, macchia mediterranea, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 2♂♂ (tutti Soldato G. leg.) ● Gorgoglione, tra, Gorgoglione e Cirigliano, 40,387181N 16,177697E, 800 m, pascolo pietroso di riva fiumara, 27.IV-17.V.2017, 1♂, Soldato G. leg. ● Potenza: Viggiano, 40,31N 15,9E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 7.V.2014, 1♂.

Distribuzione. Europa, Nord Africa, Turchia, Caucaso, Medio Oriente, Russia (Europa) fino all'Asia centrale.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per Abruzzo e Basilicata.

Haplodrassus dentifer Bosmans & Abrous, 2018

Sicilia: Caltanissetta: Piana di Gela, 18.III.2007, 1♂, Zanca L. leg. ● Palermo: Baucina, montagna, sotto le pietre, 16.IV.1988, 4♀♀, Zanca L. leg. ● Contessa Entellina, Diga Garcia, 1.IV.2007, 1♂ 1♀, Zanca L. leg. ● Corleone, Ficuzza, sotto le pietre, IV.1984, 1♂, Zanca L. leg. ● Corleone, Ficuzza, Scanzano, lago, sotto le pietre, 12.XI.1988, 3♂♂ 1♀, Zanca L. leg. ● Trapani: Favignana, Isole Egadi, Favignana, M.te Santa Caterina, 19.III.1969, 1♂, Osella G. leg. (in collezione Museo di Verona) ● Favignana, Isole Egadi, Marettimo 26.III.1969, 1♀, Osella G. leg. (in collezione Museo di Verona) ● Favignana, Isole Egadi, Marettimo, dintorni del Faro, 29.III.1969, 1♀, Osella G. leg. (in collezione Museo di Verona).

Distribuzione. Marocco, Algeria, Tunisia, Spagna.

Note. Nuova segnalazione per l'Italia

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942

Liguria: La Spezia: Varese Ligure, Passo Cento Croci, 1000 m, 17.V.1950, 1♀, di Caporiacco L. & Valle A. legerunt.

Distribuzione. Europa, Turchia, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Cina, Corea.

Note. Specie nota di poche località di Friuli, Veneto, Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta e Sicilia. Nuova segnalazione per la Liguria.

Haplodrassus macellinus (Thorell, 1871)

Basilicata: Matera: Aliano, fiume Agri, 40,339233N 16,215045E, 555 m, prato, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♀, Borghesio L. legit.
Lazio: Latina: Isola di Ponza, 40,899N 12,952E, 10 m, pitfall traps, IV.2017, 1♂ 1 ♀, Stassolla G. & Inghilesi A. legerunt.
Toscana: Pisa: Calci, Castelmaggiore, 216 m, bosco-confine, pitfall traps, 28.VII.2013, 1♀, Picchi M. legit.
Umbria: Perugia: Gualdo Tadino, Gli Zoccolanti, Sentiero della Spina, 606 m, pitfall traps, 21.IV.2014, 1♂, Salerno P. legit.

Distribuzione. Francia, Italia, Portogallo?, Spagna?

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879)

Lombardia: Cremona: Calvatone, Oasi Le Bine, 45,1386N 10,4354E, 30 m, pitfall traps, 29.V-12.VI.2021, 1♂, Ascough S., Campagnolo S. & Salami R. legerunt.

Distribuzione. Europa, Turchia, Russia (dall'Europa alla Siberia occidentale).

Note. Specie segnalata di due sole località in Irpinia (Kritscher, 1958). Nuova segnalazione per la Lombardia.

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)

Basilicata: Matera: Gorgoglione, ca 2 km a NW, 40,402612N 16,121358E, 800 m, pascolo cespugliato, pitfall traps, 8-27.IV2017, 1♀, Soldato G. leg. ● Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069N 16,189422E, 800 m, macchia mediterranea, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♀♀ (tutti Soldato G. leg.) ● Stigliano, dint. S, 40,362901N 16,226478E, 909 m, cespuglieto, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Potenza: Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 7.V.2014, 1♂ ● Grumento Nova, lago dell'Aquila, 40,29N 15,81E, 834 m, frutteto, pitfall traps, 7.V.2014, 1♂ ● Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, cespuglieto, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂ 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ (tutti Soldato G. leg.) ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E 850 m, pascolo, pitfall traps, 8.IV-27.IV2017, 1♂ 4♀♀, Borghesio L. leg. ● Laurenzana, ca 3 km a E, 40,466812N 15,999512E, 850 m, prato, pitfall traps, 8.IV-27.IV.2017, 3♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 2♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Marsicovetere, 40,34N 15,82E, 580 m, frutteto, pitfall traps, 14.III.2014, 5♂♂; *ibidem*, 31.III.2014, 5♂♂; *ibidem*, 7.V.2014, 11♂♂ 12♀♀.

Distribuzione. Nord America, Europa, Nord Africa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Israele, Iran, Asia centrale, Cina, Corea.

Note. Con le presenti segnalazioni la specie risulta ora nota di tutte le regioni italiane.

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)

Basilicata: Matera: Tricarico, bosco di latifoglie, 11.VI.2017, 2♀♀, Borio L. leg. ● Potenza: Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, futteto, pitfall traps, 7.V.2014, 2♂♂ ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 2♂♂, Borghesio L. legit.
Marche: Macerata: Castelsantangelo sul Nera, Gualdo, 900 m, VI-XII.1991, 1♂ 2♀♀, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. leg. ● Castelsantangelo sul Nera, sopra Rapegna, VI-XII.1991, 2♀♀, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. legerunt.

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardina, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Nuova segnalazione per Marche e Basilicata.

Leptodrassus albidus Simon, 1914

Abruzzo: Teramo: Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, prateria, pitfall traps, 4.VII-30.VIII.2007, 1♀, Fabbri R. legit.
Toscana: Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 2.VII.1987, 11♂♂ 7♀♀; *ibidem*, 23.VII.1987, 2♀♀ (tutti Cenzi P. leg.).

Distribuzione. Azzorre, Isole Canarie, Spagna, Grecia, Turchia, Israele.

Note. Specie nota di poche località di Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per l'Abruzzo.

Leptodrassus femineus (Simon, 1873)

Sicilia: Messina: Santa Lucia del Mela, fiume Mela, 200 - 500 m, light trap, 16.V.1995, 6♀♀, Pantini P., Valle M. legerunt.

Distribuzione. dal Portogallo alla Bulgaria e Grecia, Cipro, Israele.

Note. Specie nota di poche località di Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Marinarozelotes adriaticus (Di Caporiacco, 1951)

Abruzzo: Teramo: Pineto, dune, pitfall traps, 1998-1999, 1♂ 5♀♀, Di Febo T. leg. ● Roseto degli Abruzzi, Cologna Spiaggia, fiume Tordino, pitfall traps, 11.VI-3.VII.2003, 1♀, Fabbri R. leg. ● Roseto degli Abruzzi, Mazzarosa, torr. Borsacchio, alveto, pitfall traps, 11.VI-3.VII.2003, 5♂♂ ♀♀; *ibidem*, 11.VI-4.VII.2003, 3♂♂ 4♀♀; *ibidem*, 4.VII-30.VIII.2007, 1♂ 6♀♀ (tutti Fabbri R. leg.) ● Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, pitfall traps, 22.V-11.VI.2007, 1♂, Fabbri R. legit.

Basilicata: Potenza: Corleto Perticara, 4-5 km S lungo la SS 92, 40,350399N 16,053165E, 757 m, bosco, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. legit.

Emilia-Romagna. Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, calanco, pitfall traps, 21.VI-21.VII.2000, 1♂, Fabbri R. legit.

Marche: Ancona: Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 2.VI-17.VI2003, 7♂♂ 1; *ibidem*, 17.VI-4.VII.2003, 2♂♂ 2♀♀ (tutti Rismondo M. & Taffetani F. leg.).

Toscana: Firenze: Fiesole: loc. Girone, Fattoria Poggio Piano, 43,4637N 11,2058E, 150 m, vigneto pitfall traps, 23-29.VI.2014, 4♀♀, Masoni A. leg. ● Rignano sull'Arno, Fattoria Petriolo, 43,4417N 11,2620E, 300 m, vigneto, pitfall traps, 16-22.VI.2014, 3♂♂ 1♀, Masoni A. leg. ● Scandicci, Fattoria San Michele a Torri, 45,4638N 11,4012E, 170 m, vigneto, pitfall traps, 1-6.VII.2014, 1♀, Masoni A. leg. ● Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 2.VII.1987, 1♂, Cenzi P. legit.

Distribuzione. Dall'Italia alla Cina.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria. Nuova segnalazione per Abruzzo e Marche.

Marinarozelotes barbatus (L. Koch, 1866)

Basilicata: Matera: Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069 N 16,189422E, 800 m, cespuglieto, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂, Soldato G. leg. ● Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069 N 16,189422E, 800 m, macchia mediterranea, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂ 1♀, Soldato G. leg. ● Gorgoglione, tra Gorgoglione e Cirigliano, 40,387181N 16,177697E, 800 m, pascolo pietroso di riva fiumara, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 3♂♂, Soldato G. leg. ● Stigliano, dint. S, 40,362901N 16,226478E, 909 m, cespuglieto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 3♂♂ 1♀, Borghesio L. leg. ● Potenza: Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, cespuglieto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 2♀♀, Soldato G. leg. ● Laurenzana, ca 3 km a E, 40,466812N 15,999512E, 850 m, prato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♀, Borghesio L. legit.

Distribuzione. Dal Mediterraneo al Caucaso. Introdotto negli Stati Uniti.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Marinarozelotes fuscipes (L. Koch, 1866)

Abruzzo: Teramo: Pineto, dune, pitfall traps, 7-23.V.1998, 2♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 6-9.VII.1998, 1♂; *ibidem*, 4.III-22.V.1999, 1♂ (tutti Di Febo T. leg.).

Liguria: Imperia: Cervo, Borgata Steri, 80 m, ulitveto, pitfall traps, 2.VI-15VII.2004, 1♂, Fabbri R. leg. ● San Lorenzo al Mare, Valle Torrente Inferno, 50 m, prato arido, pitfall traps, 2.VI-15VII.2004, 1♂, Fabbri R. legit.

Distribuzione. Mediterraneo, Iran, Kazakistan, Uzbekistan, Cina.

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per Liguria e Abruzzo.

Marinarozelotes lyonneti (Audouin, 1826)

Liguria: Imperia: Cervo, Borgata Steri, 80 m, uliveto, 2.VI.2004, 1♂, Fabbri R. leg.; *ibidem*, pitfall traps, 2.VI-15.VII.2004; *ibidem*, pitfall traps, 2.VI-15.VII.2004, 12♂♂ 6♀♀ (tutti Fabbri R. leg.) ● Diano Castello, Varcavello, 100 m, prato mesofilo, pitfall traps, 2.VI-15.VII-2004, 1♂ 3♀♀, Fabbri R. leg. ● Diano Castello, Varcavello, 100 m, prato arido, 15.VII.2004, 1♂ 2♀♀, Fabbri R. leg. ● Imperia: Prino, 50 m, prato con eucalipti, pitfall traps, 27.IV-3.VI.2006, 1♂ 1♀, Fabbri R. leg. ● San Lorenzo al Mare, Valle Torrente Inferno, 50 m, prato arido, pitfall traps, 2.VI-15.VII.2004, 5♂♂ 3♀♀, Fabbri R. legit.

Marche: Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, bosco misto, pitfall traps, 1.IX-7.X.2004, 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.

Distribuzione. Macaronesia, dal Mediterraneo all'Asia centrale. Introdotto negli Stati Uniti, Messico, Perù, Brasile.

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Liguria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per le Marche.

Marinarozelotes mutabilis (Simon, 1878)

Emilia-Romagna: Ferrara: Mesola, Bosco della Mesola, Elciola, slm, lecceta, pitfall traps, 11.V-10.VI.1996, 2♂♂, Fabbri R. leg. ● Ferrara: Mesola, Bosco della Mesola, Elciola, slm, radura, pitfall traps, 10.VI-11.VII.1996, 3♀♀; *ibidem*, 11.VII-13.VII.1996, 1♂ 5♀♀ (tutti Fabbri R. leg.).

Distribuzione. Mediterraneo, Romania.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio, Puglia e Sicilia. Nuova segnalazione per l'Emilia-Romagna.

Marinarozelotes ponticus Ponomarev, 2022

Marche: Ancona: Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, boschetto, pitfall traps, 17.VI-4.VII.2003, 1♂, Rismondo M. & Taffetani F. leg. ● Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 17.VI-4.VII.2003, 1♂, Rismondo M. & Taffetani F. legerunt.

Toscana: Grosseto: Grosseto, Alberese, Parco naturale della

Maremma, Azienda Agricola Sei Busi, 42,6349N 11,1189E, 2.VII.1987, 1♂; *ibidem*, 20.IX.1987, 1♂; *ibidem*, 1.V.1988, 1♂; *ibidem*, 2.VI.1988, 2♂♂ (tutti Cenzi P. leg.) ● Grosseto, Alberese, Parco Regionale della Maremma, Azienda Agricola Le Tofane, 42,6349N 11,1189E, 8.VIII.1987, 1♂; *ibidem*, 30.X.1987, 1♂, Cenzi P. legit.

Distribuzione. Russia (Europa).

Note. Specie recentemente descritta affine a *M. bardiae* segnalato di Sicilia. Gli esemplari esaminati corrispondono bene alla descrizione di Ponomarev (2022). Nuova segnalazione per l'Italia.

Micaria coarctata (Lucas, 1846)

Basilicata: Potenza: Laurenzana, ca 3 km a E, 40,466812N 15,999512E, 850 m, prato, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Marsicovetere, 40,34N 15,82E, 580 m, frutteto, pitfall traps, VII.2012-X.2014, 1♂.
Marche: Ancona: Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 4.VII-23.VII.2003, 1♀, Rismondo M. & Taffetani F. leg. ● Ascoli Piceno: Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, bosco di carpino nero, 23.VI-27.VII.2004, 1♂, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.
Toscana: Firenze: Fiesole, loc. Girone, Fattoria Poggio Piano, 43,7769N 11,3494E, m 150, vigneto, pitfall traps, 23-29.VI.2014, 2♂♂, Masoni A. leg. ● Montespertoli, Agricampeggio Cipollatico, 43,6802N 11,1119E m 140, vigneto, pitfall traps, 7-13.VII.2014, 4♂♂ 5♀♀, Masoni A. leg. ● Rignano sull'Arno, Castello di Volognano, 43,7577N 11,4486E, m 300, vigneto, pitfall traps, 16-22.VI.2014, 6♂♂, Masoni A. leg. ● Scandicci, Fattoria San Michele a Torri, 43,7036N 11,1309E, m 170, vigneto, pitfall traps, 1-6.VII.2014, 9♂♂ 2♀♀, Masoni A. leg. ● Tavarnelle Val di Pesa, Agriturismo il Bacio, m 273, 43,5941N 11,1658E, vigneto, pitfall traps, 14-19.VII.2014, 2♀♀, Masoni A. leg. ● Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, m 100, 42,6349N 11,1189E, 2.VII.1987, 7♂♂ 1♀; *ibidem*, 23.VII.1987, 7♂♂ 3♀♀ (tutti Cenzi P. leg.).

Distribuzione. Mediterraneo, Europa orientale, Caucaso, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Iran, Kazakistan, Asia centrale.

Note. Nota di poche località di Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Micaria dives (Lucas, 1846)

Basilicata: Matera: Gorgoglione, ca 2 km a NW, 40,402612N 16,121358E, 800 m, pascolo cespugliato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Soldato G. leg. ● Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069N 16,189422E, 800 m, cespuglieto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Soldato G. leg. ● Stigliano, dint. S, 40,362901N 16,226478E, 909 m, cespuglieto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Potenza: Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, cespuglieto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Soldato G. legit.
Emilia-Romagna: Forlì-Cesena: Premilcuore, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Casa i Piani, 43,93N 11,78E, 730 m, prato termofilo, pitfall traps, 31.VII.1997, 1♂, Bertozzi M. legit.
Marche: Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, bosco misto, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♂, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.

Distribuzione. Europa, Nord Africa, Turchia, Israele, Caucaso, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Iran, Asia centrale, Pakistan, India, Cina, Corea, Giappone.

Note. Specie nota di poche località di Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. Nuova segnalazione per le Marche e la Basilicata.

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

Toscana: Arezzo: Chiusi della Verna, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Rimbocchi, Pezza, 580 m, cerrata, 5.VIII.1997, 2♀♀, Bertozzi M. legit.

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa alla Siberia meridionale), Iran, Asia centrale, Cina.

Note. Specie nota di Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria e Calabria. Nuova segnalazione per la Toscana.

Micaria pallipes (Lucas, 1846)

Sardegna: Cagliari: Monserrato, Cittadella Universitaria, 39,272N 9,123E, 8.V.2019, 1♀, Caria M. legit.

Distribuzione. Madeira, Mediterraneo, Russia (Europa), Caucaso, Kazakistan, Iran, Asia centrale.

Note. Specie nota di poche località di Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sardegna dove era segnalata unicamente da Garneri (1902).

Nomisia aussereri (L. Koch, 1872)

Basilicata: Potenza: Viggiano, 40,31N 15,9E, 600 m, frutteto, pitfall traps, X.2014, 1♀.
Marche: Ascoli Piceno: Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, prato falciato, pitfall traps, 27-VII-1.IX.2004, 3♂♂1♀, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.
Toscana: Grosseto: Grosseto, Alberese, Parco naturale della Maremma, Azienda Agricola Sei Busi 42,6349N 11,1189E, 20.IX.1987, 1♂, Cenzi P. leg. ● Parco Regionale della Maremma, Azienda Agricola Le Tofane, 42,6349N 11,1189E, 400 m, 1.X.1987, 1♀, Cenzi P. legit.

Distribuzione. Mediterraneo, Europa orientale, Turchia, Medio Oriente, Caucaso, Russia (dall'Europa alla Siberia meridionale), Kazakistan, Asia centrale, Cina.

Note. Nota di Veneto, Alto-Adige, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per Toscana, Marche e Basilicata.

Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)

Abruzzo: Teramo: Pineto, dune, pitfall traps, 1998-1999, 1♂ 1♀; *ibidem*, 7.VI-19.VI.1998, 2♀♀ (tutti Di Febo T. leg.) ● Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, prateria, pitfall traps, 4.VII-30.VIII.2007, 5♀♀, Fabbri R. legit.

Distribuzione. Europa, Nord Africa, Turchia, Caucaso, Kazakistan, Asia centrale.

Note. Specie nota di tutte le regioni italiane ad eccezione di Abruzzo e Molise. Nuova segnalazione per l'Abruzzo.

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)

Emilia-Romagna: Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, bosco termofilo, pitfall traps, 25.V-21.VII.2000, 1♂, Fabbri R. legit.

Marche: Ancona: Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 2-17.VI.2003, 1♂, Rismondo M. & Taffetani F. legerunt.

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa all'Estremo Oriente), Iran, Kazakistan, Asia centrale, Cina, Giappone.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto-Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per le Marche.

Poecilochroa variana (C.L. Koch, 1839)

Basilicata: Potenza: Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂, Borghesio L. legit.

Distribuzione. Dall'Europa all'Asia centrale

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Scotophaeus blackwalli blackwalli (Thorell, 1871)

Veneto: Padova: Teolo, 45,36307N 11,64676E, 100 m, vigneto convenzionale, pitfall traps, 10-22.VII.2020, 1♀, Trespidi G. & Turetta A. legerunt.

Distribuzione. Europa, Caucaso, Iran. Introdotto in Nord America, Perù, Hawaii.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Lazio, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per il Veneto.

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

Piemonte: Torino: Carmagnola, 240 m, 20.IX.1993, 1♀, Delmastro G.B. leg. ● Volvera, 240 m, centro abitato, 17.IV.1993, 1♀, Delmastro G.B. & Saluto M. M. legerunt.

Distribuzione. Europa, Russia (Caucaso).

Note. Specie nota di poche località di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Lazio e Campania.

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)

Umbria: Perugia: Umbertide, 43,304N 12,331E, 248 m, centro storico, 5.V.2015, 1♀, Salerno P. legit.

Distribuzione. Europa, Algeria, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa alla Siberia meridionale), Iran, Asia centrale.

Note. Specie nota di Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per l'Umbria.

Scotophaeus validus (Lucas, 1846)

Puglia: Bari: Ruvo di Puglia, abitazione, 1.IV.2010, 1♀, Loverre P. leg. ● Valenzano, Azienda Martucci, 115 m, vigneto, frappage, 11.IX.2002, 1♂, Addante R. legit.

Umbria: Perugia: Foligno, 21.IV.2015, 1♀, Salerno P. legit.

Distribuzione. Sud Europa, Marocco, Algeria.

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Trentino, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per Umbria e Puglia.

Setaphis carmeli (O. Pickard-Cambridge, 1872)

Emilia-Romagna: Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, calanco, pitfall traps, 20.IV-25.V.2000, 1♂; *ibidem*, 24.VIII-29.IX.2000, 1♂, Fabbri R. legit.

Distribuzione. Isole Canarie, Mediterraneo, Iran.

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per l'Emilia-Romagna.

Talanites strandi Spassky, 1904

Emilia-Romagna: Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, bosco termofilo, pitfall traps, 25.V-21.VI.2000, 1♂, Fabbri R. legit.

Distribuzione. Grecia, Ucraina, Russia europea meridionale, Kazakhstan.

Note. Nuova segnalazione per l'Italia. La specie ci è nota anche del territorio della Repubblica di San Marino, Castello di Borgo Maggiore, Maiano m 300, pitfall traps, 28.IV-25.V.2010, 1♀ 1juv.; *ibidem*, 25.V-16.VII.2010, 1♂; *ibidem*, 16.VII-11.VIII.2010, 1♀ (tutti Fabbri R. leg.). In figura 4 sono riportate le immagini dei genitali maschili e femminili.

Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)

Abruzzo: Teramo: Roseto degli Abruzzi, Mazzarosa, torr. Borsacchio, alveo, pitfall traps, 11.VI-4.VII.2003, 1♀; *ibidem*, 4.VII-30.VIII.2007, 1♀ (tutti Fabbri R. leg.) ● Roseto degli Abruzzi, Mazzarosa, torr. Borsacchio, bosco, pitfall traps, 11.VI-3.VII.2003, 2♂♂ 1♀, Fabbri R. legit.

Basilicata: Matera: Accettura, tra Stigliano e Accentura, lungo SP 277 stazione 25 linea 4, 40,434122N 16,167005E, 770 m, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 2♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Aliano, lungo lato sinistro fiume Agri, 40,339233 N 16,215045E, 555 m, prato, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 6♂♂ 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Cirigliano, 2-3 km NW, 40,410085N 16,152585E, 656 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♀, Borghesio L. leg. ● Cirigliano, dint. NW, 40,401907N 16,157528E, 656 m, bosco, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 1♀, Borghesio L. leg. ● Gorgoglione, 4-5 km S, 40,366272N 16,176068E, 800 m, bosco, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 4♂♂ 1♀, Borghesio L. leg. ● Gorgoglione, dint. N, 40,417252N 16,150731E,



Fig. 4. *Talanites strandi*, palpo del maschio. a) visione retrolaterale, b) visione ventrale, barra di scala 0,5 mm; c) epiginio in visione dorsale, barra di scala 0,2 mm; d) habitus del maschio, barra di scala 2 mm.

800 m, prato, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 4♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Stigliano, dint. NW lungo la SP 103, 40,416078N 16,198855E, 909 m, bosco, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♀, Borghesio L. leg. ● Stigliano, dint. S, 40,362901N 16,226478E, 909 m, cespuglieto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂ 1♀, Borghesio L. leg. ● Tricarico, bosco di latifoglie, 27.IV.2017, 1♂, Borio L. leg. ● Potenza: Castelmezzano, ca 4 km SW, 40,50138N 16,019227E, 750 m, bosco, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂, Borghesio L. leg. ● Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂, Borghesio L. leg.; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 1♀, Borghesio L. leg. ● Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, pascolo, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, 4-5 km S lungo la SS 92, 40,350399N 16,053165E, 757 m, bosco, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 7♂♂ 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 8♂♂ 2♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, ca 2 km SW, 40,370237N 16,027204E, 757 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 3♂♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 1♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, dint. S, 40,368992N 16,034014E, 757 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 5♂♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 7♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 13♂♂ 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, bosco, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 5♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 4♀♀ (tutti Soldato G. leg.) ● Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, cepuglieto, pitfll traps, 8-27.IV.2017, 2♂♂, Borghesio L. leg.; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 6♂♂ 5♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 5♀♀ (tutti Soldato G. leg) ● Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 7.V.2014, 1♂ ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 6♂♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂ 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Pietrapertosa, 9-10 km a S, 40,458329N 16,121495E, 1088 m, bosco, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♀, Borghesio L. leg. ● Pietrapertosa, 4-5 km S, 40,476306N 16,062621E, 1086 m, prato, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 2♂♂ 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 8♂♂ 2♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Viggianello, 9.VI.1989, 1♀, Valle M. leg.; VI.1990-VI.1991, 1♀, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. leg. ● Viggiano, 40,31N 15,9E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 7.V.2014, 1♂; *ibidem*, VI.2016, 1♀.

Marche: Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, prateria stabile pitfall traps, 1.IX-7.X.2004, 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, bosco di carpino nero, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♂, Rismondo M. & Taffetani F. leg.; *ibidem*, 23.VI-27.VII.2004, 1♂ 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Macerata: Sarnano, Colle, 550 m, bosco misto, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♂ 3♀♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Macerata: Sarnano, Colle, 550 m, incolto, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♂ 5♀♀, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.

Distribuzione. Europa, Caucaso, Turchia, Iran.

Note. Con le segnalazioni di Abruzzo, Marche e Basilicata la specie è ora nota di tutte le regioni Italiane.

Trichothyse furcata (Simon, 1914)

Sicilia: Trapani: Trapani, Saline, su un rametto, 18.VI.1988, 1♂, Zanca L. legit.

Toscana: Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 23.VII.1987, 3♂♂, Cenzi P. leg. ● Grosseto, Alberese, Parco Regionale della Maremma, Azienda Agricola Le Tofane, 42,6349N

11,1189E, 400 m, 23.VII.1987, 6♂♂, Cenzi P. leg.; *ibidem*, 8.VIII.1987, 1♂, Cenzi P. legit.

Distribuzione. Francia, Italia, Grecia.

Note. Specie segnalata a Marina di Pisticci in provincia di Matera (Basilicata) (Di Franco, 2001) e in Sicilia a Catania nell'Oasi del Simeto e Pachino a Pantano Cuba in provincia di Siracusa (Dentici & Galasso, 2021). Nuova segnalazione per la Toscana.

Trichothyse poonaensis (Tikader, 1982)

Sicilia: Catania: Randazzo, fiume Alcantara, 770 m, light trap, 23.V.1995, 1♂, Pantini P. & Valle M. leg. ● Messina: Pettineo, fiume di Tusa, 250 m, light trap, 23.XI.1995, 1♂, Pantini P. & Valle M. leg. ● Santa Lucia del Mela, fiume Mela, 200 m, light trap, 22.VII.1995, 1♀, Pantini P. & Valle M. legerunt.

Distribuzione. Portogallo, Spagna, Grecia, Cipro, Israele, India.

Note. Nuova segnalazione per l'Italia.

Turkozelotes noname Mazzia & Cornic, 2020

Emilia-Romagna: Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E 310 m, bosco termofilo, pitfall traps, 25.V-21.VI.2000, 2♂♂, Fabbri R. legit.

Marche: Ancona: Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 2-17.VI.2003, 5♂♂ 1♀; *ibidem*, 17.VI-4.VII.2003, 1♂ 1♀ (tutti Rismondo M. & Taffetani F. leg.) ● Ascoli Piceno: Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, bosco di carpino nero, 23.VI-27.VII.2004, 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Macerata: Sarnano, Colle, 550 m, incolto, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♂, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.

Toscana: Firenze: Fiesole, loc. Girone, Fattoria Poggio Piano, 43,4637N 11,2058E, 150 m, vigneto, pitfall traps, 23-29. VI.2014, 1♀, Masoni A. leg. ● Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 2.VII.1987, 9♂♂ 8♀♀; *ibidem*, 2.VII.1988, 4♂♂ 1♀♀, (tutti Cenzi P. leg.) ● Alberese, Parco Regionale della Maremma, Azienda Agricola Le Tofane, 42,6349N 11,1189E 400 m, 8.VIII.1987, 1♀; *ibidem*, 2.VI.1988. 8♂♂ 2♀♀ (tutti Cenzi P. leg.).

Veneto: Venezia: Chioggia, Valgrande, 45,170716N 12,260225E, slm, campo, pitfall traps, 20.VI-3.VII.2022, 1♀, Barbieri G. leg. ● Vicenza: San Germano dei Berici, 45,401N 11,467E, 205 m, vigneto, pitfall traps, 30.IV-14.V.2019, 1♀, Nardi D. leg. ● Az. AGRILUX Organic Forest, 45,391N 11,449E, 175 m, 30.IV-14.V.2019, 4♂♂ 3♀♀, Nardi D. legit.

Distribuzione. Francia.

Note. Specie nota di due località di Emilia-Romagna e Lazio. Nuove segnalazioni per Veneto, Toscana e Marche.

Zelotes aeneus (Simon, 1878)

Abruzzo: Teramo: Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, bosco, pitfall traps, 4.VII-30.VIII.2007, 1♂ 2♀♀, Fabbri R. legit.

Basilicata: Potenza: Grumento Nova, 40,31N 15,83E, 560 m, frutteto, pitfall traps, 28.VIII.2013, 1♂; *ibidem*, 26.IX.2013, 1♂ 3♀♀ ● Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 11.IX.2014, 2♂♂ 4♀♀ ● Grumento Nova, lago dell'Aquila, 40,29N 15,81E, 834 m, frutteto, pitfall traps, 28.VIII.2013, 1♂ ● Marsicovetere, 40,34N 15,82E, 580 m, frutteto, pitfall traps, 28.VII.2013, 1♀ ● Viggiano, 40,31N 15,9E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 20.X.2013, 1♂ 1♀; *ibidem*, 11.IX.2014, 2♂♂; *ibidem*, X.2014, 1♀.

Marche: Ancona, Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 23.VII-13.VIII.2003, 2♂♂; *ibidem*, 13.VIII-.IX.2003, 1♂ 3♀♀ (tutti Rismondo M., Taffetani F. leg.) ● Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, prateria stabile, pitfall traps, 1.IX-7.X.2004, 3♂♂, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, prateria stabile, pitfall traps, 27.VII-1. IX.2004, 2♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 1♂, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, prato falciato, pitfall traps, 27.VII-1.IX.2004, 1♀; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 1♂, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Macerata: Visso, Monte La Bandita, 1350 m, VI-IX.1992, 1♂, Pantini P. & Valle M. legerunt.

Umbria: Perugia: San Giustino, sopra Lama, 400, VI-IX.1992, 2♂♂, Pantini P. & Valle M. legerunt.

Distribuzione. Madeira, Europa, Turchia, Azerbaigian.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Molise e Campania. Nuove segnalazioni per Marche, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876)

Abruzzo: Teramo: Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, bosco, pitfall traps, 4.VII-30.VIII.2007, 1♂ 1♀, Fabbri R. legit.

Basilicata: Matera: Accettura, tra Stigliano e Accentura lungo SP 277 stazione 25 linea 4, 40,434122N 16,167005E, 770 m, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 2♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ (tutti Borghesio L. leg.) ● Cirigliano, dint. NW, 40,401907N 16,157528E, 656 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Stigliano, dint. NW, lungo la SP 103, 40,416078N 16,198855E, 909 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 4♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 1♂, Borghesio L. leg.; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♂ (tutti Borghesio L. leg.) ● Tricarico, bosco di latifoglie, 29.IV.2017, 2♂♂, Borio L. leg. ● Potenza: Castelmezzano, ca 4 km SW, 40,50138N 16,019227E, 750 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 2♂♂, Borghesio L. leg. ● Chiaromonte, Piano Toscano, 1750 m, II-VI.1991, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. leg. ● Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂ 2♀♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 2♂♂ 2♀♀; *ibidem*, 17.V-11. VI.2017, 1♂ 4♀♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, pascolo, pitfall traps, 1♂, Borghesio L. leg. ● Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982 N 16,134713E, 750 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂, Soldato G. leg, ● Pietrapertosa, 4-5 km S, 40,476306N 16,062621E, 1086 m, prato, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017 Borghesio L. leg. ● San Severino Lucano, presso Santuario, VI-VIII.1989, 1♂, Valle M. leg. ● Viggianello, VI.1990-VI.1991, 1♀, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. leg. ● Viggiano, 40,31N 15,9E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 22.X.2012, 1♂.

Sicilia: Messina: Monti Nebrodi, Serra del Re, 24.VI.1988, 1♂, Zanca L. legit.

Distribuzione. Europa, Turchia, Kazakistan, Iran.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. Nuova segnalazione per la Basilicata.

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)

Basilicata: Matera: Gorgoglione, dint. N, 40,417252N 16,150731E, 800 m, pascolo pietroso lungo riva fiumara, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Soldato G. leg. ● Gorgoglione, dint. N, 40,417252N 16,150731E, 800 m, prato, pitfall traps, 1♂, Borghesio L. leg. ● Potenza: Corleto Perticara, 2-3 km N 40,411662N 16,026025E, 757 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂, Borghesio L. leg. ● Grumento Nova, 40,31N 15,83E, 560 m, frutteto pitfall traps, 1.VII.2013, 1♀, leg. ● Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, VI-I.2012-X.2014, 1♂; VI.2014, 1♂ ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 5♂♂ 1♀, Borghesio L. leg. ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, prato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 3♂♂, Borghesio L. leg. ● Pietrapertosa, 4-5 km S, 40,476306N 16,062621E, 1086 m, prato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂, Borghesio L. legit.

Emilia-Romagna: Forlì-Cesena: Premilcuore, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Casa i Piani, 43,93N 11,78E, 730 m, prato termofilo, pitfall traps, 31.VII.1997, 1♂, Bertozzi M. leg. ● Modena: Prignano sulla Secchia, loc. La Quercia, 400 m, pitfall traps, 5-18.VII.2006, 1♀, Fabbri R. leg. ● Ravenna: Mezzano, vasche dell'ex zuccherifcio, pitfall traps, 7-27.V.2006, 1♂, Fabbri R. & Pezzi G. legerunt.

Marche: Ancona, Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, boschetto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂ 1♀, Rismondo M. & Taffetani F. leg. ● Ancona, Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall trap, 2-17.VI.2003, 8♂♂ 16♀♀; *ibidem*,17.VI-4.VII.2003, 2♂♂ 2♀♀: *ibidem*, 4-23. VII.2003, 1♂ 3♀♀ (tutti Rismondo M. & Taffetani F. leg.) ● Macerata: Visso, Monte La Bandita, 1350 m, VI.1991-VI.1992, 2♂♂, Pantini P. & Valle M. legerunt.

Puglia: Bari: Altamura, C.da Cervoni, 517 m, pascolo, pitfall traps, 9.VII.2007, 1♀, Pizza M. legit.

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Russia (Europa) fino all'Asia centrale, Cina.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Nuova segnalazione per Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Basilicata.

Zelotes balcanicus Deltshev, 2006

Abruzzo: L'Aquila: Capestrano, Gran Sasso, Forca di Penne m 800 – 880, 31.VIII.2002, 1♀, Marotta O., Di Marco C. leg. ● Capestrano, Gran Sasso, Scarafano m 820, 26.VI.2002, 1♂, Marotta O. legit.

Basilicata: Matera: Cirigliano, dint. NW, 40,401907N 16,157528E, 656 m, bosco, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Gorgoglione, 4-5 km S, 40,366272N 16,176068E, 800 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, ca 2 km SW, 40,370237N 16,027204E, 757 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 2♂♂, Borghesio L. leg. ● Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, bosco, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 2♂♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♀ (tutti Soldato G. legit).

Puglia, Bari: Putignano, Barsento, 382 m, ecotono fragneto-erbaio, pitfall traps, 6.X.2004, 1♂, Addante R. legit.

Distribuzione. Italia, Bulgaria, Romania, Grecia, Macedonia del Nord, Israele.

Note. Specie nota di una località di Calabria (Pantini & Mazzoleni, 2018). Nuova segnalazione per Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Zelotes callidus (Simon, 1878)

Toscana: Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 2.VII.1987, 1♂, Cenzi P. leg. ● Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 23.VII.1987, 7♂♂ 1♀; *ibidem*, 2.VI.1988, 1♂ (tutti Cenzi P. leg.) ● Grosseto, Alberese, Parco naturale della Maremma, Azienda Agricola Sei Busi, 42,6349N 11,1189E, 8.VIII.1987, 2♂♂; *ibidem*, 10.X.1987, 1♀ (tutti Cenzi P. leg.) ● Grosseto, Alberese, Parco Regionale della Maremma, Azienda Agricola Le Tofane, 42,6349N 11,1189E, 400 m, 23.VII.1987, 2♀♀; *ibidem*, 8.VIII.1987, 9♂♂ 6♀♀; *ibidem*, 1.IX.1987, 2♀♀ (tutti Cenzi P. legit).

Puglia: Bari: Valenzano, m 119, oliveto, 2.VII.2003, 1♀, Addante R. leg. ● Valenzano, Azienda Martucci, m 115, oliveto, 2.VII.2003, 1♂, Addante R. legit.

Sicilia: Trapani: Favignana, Isola di Favignana, Capo Canalello c/o Punta Fanfalo m 15, 2.VII.2003, 1♀, Ciocca S. legit.

Distribuzione. Spagna (continentale, Minorca), Francia, Italia, Marocco.

Note. Specie nota di poche località di Liguria, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per la Toscana.

Zelotes caprearum (Pavesi, 1875)

Basilicata: Matera: Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069N 16,189422E, 800 m, cespuglieto, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♀, Soldato G. leg. ● Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069N 16,189422E, 800 m, macchia mediterranea, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♀♀ (tutti Soldato G. leg.) ● Stigliano, dint. S, 40,362901N 16,226478E, 909 m, cespuglieto, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♀, Borghesio L. leg. ● Potenza: Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 7.V.2014, 1♀; Grumento Nova, lago dell'Aquila, 40,29N 15,81E, 834 m, frutteto, pitfall traps, 26.IX.2013, 1♀ ● Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982 N 16,134713E, 750 m, cespuglieto, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 3♀♀ (tutti Soldato G. legit).

Distribuzione. Italia.

Note. Specie endemica italiana. Nota di Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Zelotes criniger Denis, 1937

Toscana: Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 2.VII.1987, 1♀, Cenzi P. leg. ● Grosseto, Alberese, Parco naturale della Maremma, Azienda Agricola Sei Busi, 42,6349N 11,1189E, 2.VII.1987, 1♀, Cenzi P. leg. ● Grosseto, Alberese, Parco Regionale della Maremma, Azienda Agricola Le Tofane, 42,6349N 11,1189E, 400 m, 2.VI.1988, 1♂, Cenzi P. legit.

Distribuzione. Mediterraneo.

Note. Specie nota di poche località di Puglia e Sicilia. Nuova segnalazione per la Toscana.

Zelotes egregioides Senglet, 2011

Marche: Ancona: Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 13.VIII-5.IX.2003, 1♀, Rismondo M. & Taffetani F. legerunt.

Distribuzione. Portogallo, Spagna, Francia.

Note. Specie nota di una località di Sicilia. Nuova segnalazione per le Marche.

Zelotes egregius Simon, 1914

Puglia: Bari: Putignano, Barsento, 382 m, ecotono fragneto-erbaio, pitfall traps, 6.X.2004, Addante R. legit.

Distribuzione. Spagna, Andorra, Francia, Italia, Russia (Caucaso).

Note. Specie nota di poche località di Lazio, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per la Puglia.

Zelotes electus (C.L. Koch, 1839)

Emilia-Romagna: Ferrara: Mesola, Bosco della Mesola, Elciola, slm, lecceta, pitfall traps, 20.VII-31.VIII.1995, 1♀, Fabbri R. leg. ● Mesola, Bosco della Mesola, Elciola, slm, radura, pitfall traps, 10.VI-11.VII.1996, 1♀; *ibidem*, 18.IX-23.X.1996, 1♂ (tutti Fabbri R. legit).

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa alla Siberia meridionale), Kazakistan, Iran, Turkmenistan.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Sicilia.

Zelotes femellus (L. Koch, 1866)

Abruzzo: Teramo: Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, prateria, pitfall traps, 4.VII-30.VIII.2007, 2♂♂ 2♀♀, Fabbri R. legit.

Basilicata: Matera: Gorgoglione, tra Gorgoglione e Cirigliano, 40,387181N 16,177697E, 800 m, pascolo pietroso lungo riva fiumara, pitfall taps, 27.IV-17.V.2017, 1♀, Soldato G. leg. ● Potenza: Grumento Nova, 40,31N 15,83E, 560 m, frutteto, pitfall traps, 22.X.2012, 1♂ ● Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 11.IX.2014, 2♂♂ ● Marsicovetere, 40,34N 15,82E, 580 m, frutteto, pitfall traps, 26.IX.2013, 2♂♂ 1♀ ● Viggiano, 40,31N 15,9E, frutteto, 22.X.2012, 1♂; *ibidem*, 20.X.2013, 1♂; *ibidem*, 11.IX.2014, 1♂; *ibidem*, X.2014, 2♂♂ 2♀♀.

Lombardia: Cremona: Calvatone, Oasi Le Bine, 45,1386N 10,4354E, m 30, pitfall traps, 22.VIII-4.IX.2021, 1♂; *ibidem*, 4-18.IX.2021, 1♂; *ibidem*, 1-16.X.2021, 2♂♂ (tutti Ascough S., Campagnolo S., Salami R. legerunt).

Marche: Ascoli Piceno: Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, m 790 – 1000, pitfall traps, 27.VII-1.IX.2004, 9♂♂; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 1♂ (tutti Rismondo M., Fabbri R. legerunt).

Distribuzione. Europa del Sud.

Note. Specie nota di poche località di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per Marche e Basilicata.

Zelotes fulvaster (Simon, 1878)

Toscana: Firenze: Fiesole, Loc. Girone, Fattoria Poggio Piano, 43,7769N 11,3494E, m 150, vigneto, pitfall traps, 23-29.VI.2014, 2♂♂ 7♀♀, Masoni A. leg. ● Montespertoli, Agricampeggio Cipollatico, 43,6802N 11,1119E, m 140, vigneto, pitfall traps, 7-13.VII.2014, 2♂♂ 1♀, Masoni A. leg. ● Rignano sull'Arno, Castello di Volognano, 43,7577N 11,4486E, m 300, vigneto, pitfall traps, 16-22.VI.2014, 5♂♂ 2♀♀, Masoni A. leg. ● Rignano sull'Arno, Fattoria Petriolo, 43,7380N 11,4388E, m 300, vigneto, pitfall traps, 16-22.VI.2014, 3♂♂, Masoni A. leg. ● San Casciano in Val di Pesa, Mercatale Val di Pesa, Fattoria Castello di Gabbiano, 43,6275N 11,2592E, m 270, vigneto, pitfall traps, 1-6.VII.2014, 1♀, Masoni A. leg. ● Tavarnelle Val di Pesa, Agriturismo il Bacio, 43,5943N 11,1659E, m 273, vigneto, pitfall traps, 14-19.VII.2014, 1♀, Masoni A. legit.

Distribuzione. Corsica, Italia, Macedonia del Nord, Bulgaria, Grecia, Turchia, Cipro, Russia europea, Iran.

Note. Specie nota di due sole località sul Monte Pisano in Toscana (Picchi, 2020).

Zelotes gallicus Simon, 1914

Trentino-Alto Adige: Trento: Peio, Transetto Val di Peio, Feraion, 46,3829N 10,6888E, 1437 m, pitfall traps, 26.VIII.2015, 1♀, PN dello Stelvio legit.

Distribuzione. Europa, Kazakistan.

Note. Specie nota di poche località di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana. Nuova segnalazione per il Trentino.

Zelotes hermani (Chyzer, 1897)

Basilicata: Potenza: Grumento Nova, 40,31N 15,83E, 560 m, frutteto, pitfall traps, 28.VIII.2013, 3♂♂ 1♀; *ibidem*, 26.IX.2013, 8♂♂ 5♀♀ ● Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, VI.2014, 1♀ ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♀ (tutti Borghesio L. leg.)

Marche: Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, prateria stabile pitfall traps, 27.VII-1.IX.2004, 1♂, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, bosco di caprino nero, pitfall traps, 27.VII-1.IX.2004, 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg.; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 3♂♂ (tutti Rismondo M. & Fabbri R. leg.) ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, prateria stabile, pitfall traps, 27.VII-1.IX.2004, 3♂♂;

ibidem,1.IX-7.X.2004, 1♂ (tutti Rismondo M. & Fabbri R. leg.).

Distribuzione. Dall'Europa centrale alla Russia (Europa, Caucaso), Turchia.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Nuove segnalazioni di Marche e Basilicata.

Zelotes khostensis Kovblyuk & Ponomarev, 2008

Basilicata: Potenza: Viggianello, pitfall traps, VII-VIII.1993, 1♂, Pantini P. & Valle M. leg. ● Viggiano, 40,31N 15,9E, 600 m, 11.IX.2014, 1♀

Emilia-Romagna: Forlì-Cesena, Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Pietrapazza, m 600, bosco carpino nero e carpino bianco, V.1997, 1♂, Bertozzi M. leg. ● Ravenna: Brisighella, IT407001 Vena del Gesso Romagnola, Monte Rontana, loc. Rontana, m 368-412, 44,22197N 11,74545E, rimboschimenti di conifere realizzati nel dopo guerra, 8.VII-26.VIII.2020, 1♂ 1♀; *ibidem*, 26.VIII-18.X.2020, 1♂; *ibidem*, bosco, 5.VII-11.X.2023, 1♂ (tutti pitfall traps, Fabbri R. legit) ● Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, m 310 – 530, 43,86N 12,54E, bosco, pitfall traps, 24.VIII.2000, 1♂, Fabbri R. leg.; *ibidem*, prato confine, pitfall traps, 28.X-22.XI.2002, 1♀, Bertozzi M., Fabbri R. legerunt.

Marche: Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, m 680, prateria stabile, 27.VII-1.IX.2004, 1♀; *ibidem*, bosco misto, 1.IX-7.X.2004, 1♂; *ibidem*, prateria stabile, 1.IX-7.X.2004, 3♂♂ 1♀ (tutti pitfall traps, Rismondo M., Fabbri R. legerunt) ● Montemonaco, Isola San Biagio, m 790 – 1000, 44,970N 9,250E, bosco carpino nero, 27.VII-1.IX.2004, 1♀; *ibidem*, prato falciato pitfall traps 1.IX-7.X.2004 1♂ (tutti pitfall traps, Rismondo M., Fabbri R. legerunt) ● Macerata: Sarnano, Colle, m 550, bosco misto, 23.VI-27.VII.2004, 1♂; *ibidem*, bosco misto, 27.VII-1.IX.2004, 1♀; *ibidem*, incolto, 27.VII-1.IX.2004, 1♂; *ibidem*, bosco misto, 1.IX-7.X.2004, 5♂♂ 2♀♀ (tutti pitfall traps, Rismondo M., Fabbri R. legerunt).

Toscana: Arezzo: Chiusi della Verna, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Rimbocchi, Pezza, m 580, cerreta, 5.VIII.1997, 5♂♂, Bertozzi M. legit.

Distribuzione. Italia, Caucaso (Russia, Georgia), Iran.

Note. Specie nota di poche località di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Calabria. Nuove segnalazioni per Toscana, Marche e Basilicata.

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

Emilia-Romagna: Forlì-Cesena: Premilcuore, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Casa i Piani, 43,93N 11,78E, 730 m, prato, pitfall traps, 3.IX.1997, 6♂♂ 1♀, Scaravelli D. & Bertozzi M. leg. ● Premilcuore, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Casa i Piani, 43,93N 11,78E, 730 m, prato termofilo, pitfall traps, 31.VII.1997, 2♀♀; *ibidem*, 3.XI.1997, 3♂♂ 1♀ (tutti Bertozzi M. leg.) ● Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Corniolo, Pian del Grado, 43,89N 11,72E, 780m, bosco, 5.VIII.1997, 2♂♂, Scaravelli D. & Bertozzi M. leg. ● Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Corniolo-Campigna, S. Paolo in Alpe, 43,87N 11,79E, 1020 m, prato, 27.VIII.1997, 2♂♂ 1♀, Scaravelli D. & Bertozzi M. leg. ● Santa Sofia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Il Sasso, 815 m, sopra bosco ripariale, pitfall traps, 28.VIII.1997, 1♂, Bertozzi M. leg. ● Modena: Prignano sulla Secchia, loc. La Quercia, 400 m, pitfall traps, 5-18.VII.2006, 1♂, Fabbri R. legit.

Marche: Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, prateria stabile, pitfall traps, 27.VII-1.IX.2004, 2♂♂ 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. legerunt.

Distribuzione. Europa, Turchia, Caucaso, Russia (dall'Europa alla Siberia meridionale), Kazakistan.

Note. Specie nota di poche località di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise e Calabria. In Emilia Romagna era nota solo per una vecchia segnalazione generica del modenese di Canestrini e Pavesi (1868)

Zelotes metellus (Roewer, 1928)

Abruzzo: Teramo: Roseto degli Abruzzi, Mazzarosa, torr. Borsacchio, alveo, pitfall traps, 11.VI-4.VII.2007 1♂, Fabbri R. legit.

Marche: Ancona: Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, boschetto, pitfall traps, 17.VI-4.VII.2003, 1♀, Rismondo M. & Taffetani F. leg. ● Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 2-17.VI.2003, 2♂♂; *ibidem*, 17.VI-4.VII.2003, 1♀; *ibidem*, 23.VII-13.VIII.2003, 1♂ (tutti Rismondo M., Taffetani F. leg.).

Sardegna: Sud Sardegna: Guspini, Montevecchio, Piccalinna, 235 m, gariga, pitfall traps, 3-15.VI.2009, 1♀, Verdinelli M. & Sassu A. legerunt.

Toscana: Firenze: Fiesole, loc. Girone, Fattoria Poggio Piano, 43,4637N 11,2058E, 150 m, vigneto, pitfall traps, 23-29.VI.2014, 1♂, Masoni A. leg. ● Montespertoli, Agricampeggio Cipollatico, 43,4049N 11,0643E, 140 m, vigneto, pitfall traps, 7-13.VII.2014, 6♂♂ 6♀♀, Masoni A. leg. ● Rignano sull'Arno, Fattoria Petriolo, 43,4417N 11,2620E, 300 m, vigneto, pitfall traps, 16-22.VI.2014, 1♂ 2♀♀, Masoni A. leg. ● Scandicci, Fattoria San Michele a Torri, 45,4638N 11,4012E, 170 m, vigneto, pitfall traps, 1-6.VII.2014, 1♂, Masoni A. leg. ● Grosseto: Grosseto, Alberese, Parco naturale della Maremma, Azienda Agricola Sei Busi, 42,6349N 11,1189E, vigneto, pitfall traps, 23.VII.1987, 1♀, Cenzi P. legit.

Veneto: Venezia: Chioggia, Valgrande, 45,170716N 12,260225E, slm, campo, pitfall traps, 3-17.VII.2022, 1♂; *ibidem*, 11-24.IX.2022, 1♀ (tutti Barbieri G. leg.) ● Chioggia, Valgrande, 45,170716N 12,260225E, slm, margine campo coltivato, pitfall traps, 19.VI-2.VII.2022, 1♂, Barbieri G. legit.

Distribuzione. Francia, Italia, Albania, Grecia verso Iran, Israele, Russia (Europa).

Note. Specie nota di una sola località dell'Emilia-Romagna (Lami *et al*., 2023). Nuova segnalazione per Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo e Sardegna.

Zelotes oblongus (C.L. Koch, 1833)

Basilicata: Potenza: Corleto Perticara, 4-5 km S lungo la SS 92, 40,350399N 16,053165E, 757 m, bosco, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 2♀♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Corleto Perticara, 2-3 km N, 40,411662N 16,026025E, 757 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♀, Borghesio L. leg. ● Laurenzana, ca 2 km

a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, pascolo, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♀, Borghesio L. leg. ● Laurenzana, ca 2 km a E, 40,452416N 16,000948E, 850 m, prato, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 3♂♂; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 1♂ 1♀ (tutti Borghesio L. leg.) ● Pietrapertosa, 4-5 km S, 40,476306N 16,062621E, 1086 m, prato, pitfall traps, 8-27.IV.2017, 1♀; *ibidem*, 27.IV-17.V.2017, 1♂ 1♀; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 1♀ (tutti Borghesio L. leg.).
Marche: Ascoli Piceno: Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, prateria stabile, pitfall traps, 23.V-27.VII.2004, 2♀♀; *ibidem*, 27.VII-1.IX.2004, 1♂; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 2♀♀ (tutti Rismondo M. & Fabbri R. leg.) ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, prato falciato, pitfall traps, 23.V-27.VII.2004, 2♀♀; *ibidem*, 27.VII-1.IX.2004, 7♂♂; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 1♀ (tutti Rismondo M. & Fabbri R. leg.) ● Macerata: Fiuminata, Passo Cornello, 800 m, VI-XII.1991, 2♂♂ 2♀♀, Buttarelli G., Pantini P. & Valle M. leg.; *ibidem*, VI-IX.1992, 1♀, Pantini P. & Valle M. leg. ● Sefro, 13.IX.1988, 1♀, Valle M. legit.
Toscana: Firenze: San Casciano in Val di Pesa, Mercatale Val di Pesa, Fattoria Castello di Gabbiano, N 43°62'79" E 11°26'04", m 270, vigneto, pitfall traps, 1-6.VII.2014, 1♂, Masoni A. leg. ● Grosseto: Grosseto, Albarese, Parco Regionale della Maremma, 42,6349N 11,1189E, 100 m, 1.V.1988, 1♂ 1♀, Cenzi P. leg. ● Lucca: Lucca: San Lorenzo a Vaccoli, m 10, oliveto, pitfall traps, 24.VII.2013, 1♀, Picchi M. legit

Distribuzione. Europa, Turchia.

Note. Specie nota di Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia e Basilicata. Nuova segnalazione per le Marche.

Zelotes paroculus Simon, 1914

Basilicata: Matera: Aliano, lungo lato sinistro fiume Agri, 40,339233N 16,215045E, 555 m, prato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Gorgoglione, ca 2 km a NW, 40,402612N 16,121358E, 800 m, pascolo cespugliato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂, Soldato G. leg. ● Gorgoglione, ca 5 km a S del paese, 40,350069N 16,189422E, 800 m, cespuglieto, pitfall traps, 27.IV-17.V.2017, 2♂♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 2♂♂2♀♀ (tutti Soldato G. leg.) ● Stigliano, dint. S, 40,362901N 16,226478E, 909 m, cespuglieto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. leg. ● Potenza: Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, bosco, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♀, Soldato G. leg. ● Guardia Perticara, ca 3-4 km SE, 40,352982N 16,134713E, 750 m, cespuglieto, 27.IV-17.V.2017, 1♂; *ibidem*, 17.V-11.VI.2017, 3♂♂ (tutti Soldato G. leg.) ● Pietrapertosa, 4-5 km S, 40,476306N 16,062621E, 1086 m, prato, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 16♂♂ 1♀, Borghesio L. legit.
Emilia-Romagna: Modena: Prignano sulla Secchia, loc. La Quercia, 400 m, 5-18.VII.2006, 1♀, Fabbri R. legit.
Marche: Ancona: Serra de' Conti, bacino Spescia, 100 m, margine, pitfall traps, 2-17.VI. 2003, 1♂, Rismondo M. & Taffetani F. leg. ● Ascoli Piceno: Amandola, Vidoni, 680 m, bosco misto, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 1♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Amandola, Vidoni, 680 m, prateria stabile, pitfall traps, 23.VI-27.VII.2004, 2♀♀, Rismondo M. & Fabbri R. leg. ● Montemonaco, Isola San Biagio, 44,970N 9,250E, 790 m, prato falciato, 23.VI-27.VII.2004, 1♂ 1♀; *ibidem*, 1.IX-7.X.2004, 2♀♀ (tutti Rismondo M. & Fabbri R. legerunt).
Umbria: Perugia: Gualdo Tadino, Gli Zoccolanti, Sentiero della Spina, 606 m, 21.IV.2014, 3♂♂, Salerno P. leg. ● San Giustino, Parco Roccolo, 43,549N 12,176E, 375 m, 6.V.2015, 2♂♂, Salerno P. legit.

Distribuzione. Francia, Italia.

Note. Specie nota di poche località di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Calabria. Nuova segnalazione per Emilia-Romagna, Marche e Basilicata.

Zelotes tenuis (L. Koch, 1866)

Abruzzo: Teramo: Pineto, dune, pitfall traps, 1998-1999, 2♂♂ 2♀♀, Di Febo T. leg. ● Roseto degli Abruzzi, Cologna Spiaggia, fiume Tordino, pitfall traps, 11.VI-3.VII.2003, 4♂♂ 2♀♀, Fabbri R. leg. ● Roseto degli Abruzzi, Mazzarosa, torr. Borsacchio, alveto, pitfall traps, 11.VI-4.VII.2003, 1♂ 1♀, Fabbri R. leg. ● Roseto degli Abruzzi, Mazzarosa, torr. Borsacchio, bosco, pitfall traps, 11.VI-4.VII.2003, 1♂ 1♀, Fabbri R. leg. ● Roseto degli Abruzzi, Parco della tenuta Mazzarosa, 11.VI-4.VII.2003, 1♂, Fabbri R. legit.
Basilicata: Matera: Gorgoglione, ca 2 km a E, 40,387624N 16,167302E, 800 m, greto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Soldato G. leg. ● Potenza: Grumento Nova, contrada Pantanelle, 40,26N 15,89E, 600 m, frutteto, pitfall traps, 8.VIII.2014, 2♀♀ ● Marsicovetere, 40,34N 15,82E, 580 m, frutteto, pitfall traps, IV.2013, 1♀; 28.VII.2013, 2♀♀ ● Missanello, lungo fiume Agri (via Saurina), 40,337491N 16,174729E, 640 m, greto, pitfall traps, 17.V-11.VI.2017, 1♂, Borghesio L. legit.

Distribuzione. dal Mediterraneo e dall'Europa centrale alla Russia (Caucaso). Introdotto alle Galapagos, USA.

Note. Specie nota di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Nuova segnalazione per l'Abruzzo.

Zelotes zellensis Grimm, 1982

Emilia-Romagna: Rimini: Gemmano, Riserva Regionale Onferno, 43,86N 12,54E, 310 m, calanco, pitfall traps, 24.VIII-29.IX.2000, 1♂ 2♀♀, Fabbri R. legit.

Distribuzione. Alpi (Germania, Austria, Italia).

Note. Nota in Italia di due sole località di Alto Adige e Liguria. Nuova segnalazione per l'Emilia-Romagna.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'elenco riporta dati di più di 1.800 esemplari di Gnaphosidae conservati al Museo di Scienze Naturali di Bergamo riferibili a 79 specie per le quali vengono fornite segnalazioni inedite, di 66 specie vi sono nuove segnalazioni a livello regionale. Vengono segnalate per la prima volta per il territorio italiano *Haplodrassus dentifer*, *Marinarozelotes ponticus*, *Trichothyse poonaensis* e *Talanites strandi*, portando a 179 le specie di Gnaphosidae attualmente note per l'Italia. La tabella 1 riporta sinteticamente i dati delle specie di gnafosidi note per l'Italia eviden-

Tab. 1. Tabella riassuntiva della distribuzione a livello regionale delle specie di Gnaphosidae presenti in Italia sulla base di quanto riportato dal sito Araneae.it (Isaia *et al*., 2025) e dei dati pubblicati nel presente lavoro. Il quadrato grigio indica la presenza della specie nella regione ricavata dai dati di letteratura, il quadrato verde che la specie era già della regione ma nuovi dati inediti sono stati riportati nel presente lavoro, il quadrato rosso indica che la specie è stata segnalata per la prima volta nella regione nel presente lavoro.




Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Lombardia
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Abruzzo
Lazio
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sardegna
Sicilia
totali
Gnaphosa corticola 3
Gnaphosa dolosa 4
Gnaphosa inconspecta 1
Gnaphosa lapponum 2
Gnaphosa leporina 6
Gnaphosa lonai 1
Gnaphosa lucifuga 17
Gnaphosa lugubris 14
Gnaphosa modestior 4
Gnaphosa montana 4
Gnaphosa muscorum 3
Gnaphosa nigerrima 1
Gnaphosa occidentalis 3
Gnaphosa petrobia 6
Gnaphosa rhenana 5
Gnaphosa tigrina 2
Haplodrassus aenus 3
Haplodrassus cognatus 2
Haplodrassus concertor 1
Haplodrassus crassipes 1
Haplodrassus dalmatensis 17
Haplodrassus dentifer 1
Haplodrassus kulczynskii 7
Haplodrassus macellinus 12
Haplodrassus minor 2
Haplodrassus rhodanicus 1
Haplodrassus rufipes 9
Haplodrassus securifer 3
Haplodrassus signifer 20
Haplodrassus silvestris 9
Haplodrassus soerenseni 3
Haplodrassus typhon 1
Haplodrassus umbratilis 4
Heser nilicola 8
Kishidaia conspicua 5
Leptodrassus albidus 5
Leptodrassus diomedeus 1
Leptodrassus femineus 5
Marinarozelotes adriaticus 10
Marinarozelotes barbatus 12
Marinarozelotes bardiae 1
Marinarozelotes fuscipes 13
Marinarozelotes holosericeus 3
Marinarozelotes huberti 5
Marinarozelotes lyonneti 5
Marinarozelotes mutabilis 8
Marinarozelotes ponticus 2
Micaria aenea 5
Micaria albovittata 9
Micaria alpina 3
Micaria coarctata 9


Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Lombardia
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Abruzzo
Lazio
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sardegna
Sicilia
totali
Micaria cyrnea 3
Micaria dives 5
Micaria formicaria 8
Micaria fulgens 10
Micaria funerea 1
Micaria micans 4
Micaria nivosa 1
Micaria pallipes 4
Micaria pulicaria 11
Micaria rossica 4
Micaria silesiaca 4
Micaria sociabilis 3
Micaria subopaca 4
Micaria tripunctata 1
Nomisia aussereri 14
Nomisia excerpta 2
Nomisia exornata 19
Nomisia molendinaria 1
Nomisia recepta 4
Parasyrisca vinosa 5
Phaeocedus braccatus 14
Poecilochroa albomaculata 5
Poecilochroa variana 10
Scotophaeus blackwalli 10
Scotophaeus fabrisae 1
Scotophaeus quadripunctatus 5
Scotophaeus retusus 1
Scotophaeus scutulatus 14
Scotophaeus validus 12
Setaphis carmeli 9
Setaphis mollis 1
Setaphis parvula 3
Sosticus loricatus 3
Synaphosus sauvage 1
Talanites strandi 1
Trachyzelotes pedestris 20
Trichothyse furcata 3
Trichothyse loricata 1
Trichothyse pooanensis 1
Trichothyse senilis 1
Turkozelotes noname 5
Urozelotes mysticus 1
Urozelotes rusticus 13
Zelotes aeneus 16
Zelotes apricorum 18
Zelotes atrocaeruleus 13
Zelotes balcanicus 4
Zelotes calactinus 1
Zelotes callidus 8
Zelotes caprearum 6
Zelotes clivicola 7



ziando i nuovi dati segnalati nel presente lavoro. Per 13 regioni vi sono nuove segnalazioni; particolarmente significativo è stato l'incremento delle specie note per alcune regioni del centro-sud (Marche, Abruzzo e Basilicata). I dati complessivamente mostrano un maggior numero di specie presenti nelle regioni del nord Italia come evidenziato in generale per i ragni da Isaia *et al.* (2025). Considerando le regioni settentrionali (comprendendo Liguria ed Emilia Romagna) la media di specie presenti è pari a 65 mentre per le regioni centro-meridionali la media si abbassa sensibilmente a 44,6. Tuttavia la regione con il maggior numero di specie segnalate è la Sicilia (77) con un valore molto simile a quelli delle regioni settentrionali più studiate dal punto di vista araneologico quali Veneto (74), Lombardia (76) e Piemonte (75). Questo è certamente dovuto alle accurate ricerche svolte sul territorio siciliano da Francesca Di Franco (1986, 1993, 1995, 1998b, 2001). La conoscenza della diversità biologica della fauna araneologica è imprescindibile dalle ricerche puntualie svolte sul territorio che purtroppo sono molto lacunose. I nuovi strumenti di citizen science basati sul riconoscimento fotografico come iNaturalist, che in alcuni casi permettono di ampliare notevolmente le conoscenze sulla distribuzione delle specie (Uliana

et al., 2016; Ceccolini 2024), al momento non sono in grado di fornire dati attendibili per questa famiglia. Gli Gnaphosidae non sono, salvo importanti eccezioni, ragni vistosi ed essendo generalmente notturni, non vengono comunemente notati dal profano. Molte specie hanno un aspetto assai uniforme che rende molto difficile l'identificazione a livello specifico inoltre poco noto è l'aspetto delle diverse specie in natura essendo la maggior parte delle descrizioni basata su esemplari conservati in alcool, sarebbe dunque necessaria un'azione di "educazione" dell'AI attraverso fotografie realizzate *ad hoc* ad esemplari in vivo poi determinati mediante l'osservazione in laboratorio dei caratteri morfologici dei genitali per fare in modo che l'algoritmo possa affidarsi a immagini sicure.

RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno raccolto il materiale e lo hanno depositato presso il Museo di Scienze Naturali di Bergamo, in particolare: Rocco Addante, Giacomo Barbieri, Simone Ciocca, Roberto Fabbri, Marco Isaia, Agostino Letardi, Alberto Masoni, Davide Nardi, Pietro Salerno, Michele Sarà, Dino Scaravelli, Barbara Thaler Knoflach, Laura Zanca.

BIBLIOGRAFIA

BOGLIANI G., BONTARDELLI L., GIORDANO V., LAZZARINI M. & RUBOLINI D., 2003 − Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei parchi del Ticino Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino. 1−176.

BRIGNOLI P.M. & GADDINI A., 1979 − Nuovi dati su alcuni Anyphenidae, Liocranidae e Gnaphosidae italiani (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 34: 10−15.

BRIGNOLI P.M. & MURPHY J., 1984 − Nuovi dati su alcuni Gnaphosidae italiani (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 38(1983): 1−4.

CANESTRINI, G., 1868 − Nuovi aracnidi italiani. Annuario della Società dei Naturalisti in Modena 3: 190-206.

CANESTRINI G. & PAVESI P., 1868 − Araneidi italiani. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 11(3): 738−872.

CECCOLINI F., 2024 − Review of the distribution of the Mediterranean black widow *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) and the false widow spider *Steatoda paykulliana* (Walckenaer, 1806) in Italy with new records (Araneae: Theridiidae). Natura Somogyiensis 44: 51−66.

CIOCCA S. & PANTINI P., 2011 − I ragni epigei (Arachnida, Araneae) di alcuni ambienti perifluviali della pianura Bergamasca (Italia, Lombardia). Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi", Bergamo 25: 111−156.

DENTICI A. & GALASSO P., 2021 − Checklist of spiders and opiliones (Arachnida Araneae, Opiliones) of Sicilian southest swamp lakes "Pantano Cuba", "Pantano Longarini" and "Pantano Bruno" (Italy). Fifth contribution to knowledge of Sicilian spider fauna. Biodiversity Journal 12(3): 695−703

DI CAPORIACCO L., 1936 − Saggio sulla fauna aracnologica del Casentino, Val d'Arno Superiore e Alta Val Tiberina. Festschr. Strand 1: 326−369.

DI FRANCO F., 1986 − Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) dell'Isola di Salina (Isole Eolie). Animalia 13(1−3): 137−157.

DI FRANCO F., 1988 − *Cybaeodes marinae*, una nuova specie di Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) d'Italia. Animalia 15(1−3): 25−36.

DI FRANCO F., 1989 − Una nuova specie di *Zelotes* di Sicilia (Araneae, Gnaphosidae). Animalia 15(1−3): 65−74.

DI FRANCO F., 1992 − Gnaphosidae di Castelporziano e del Parco Nazionale del Circeo (Aracnida, Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 23(2): 213−233.

DI FRANCO F., 1993 − New reports and remarks on Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) of Sicily. Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 26(345): 85−92.

DI FRANCO F., 1995 − Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) di Cava Grande (Siracusa, Sicilia). Animalia 21(1−3): 117−123.

DI FRANCO F., 1996 − Gnaphosidae dei Colli Albani (Arachnida, Araneae) Fragmenta entomologica, Roma 28(2): 169−187.

DI FRANCO F., 1997 − Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti della Tolfa (Lazio) (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 29(2): 253−266.

DI FRANCO F., 1998a − Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti Sabini, Monti Ernici e Monti Cimini (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 30(2): 217−228.

DI FRANCO F., 1998b − Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva naturale orientata "Oasi di Vendicari" (Siracusa). Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 30: 331−340.

DI FRANCO F., 2001 − Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto" (Catania). Naturalista Siciliano 25(1-2): 195−215.

DI FRANCO F., 2002 − New data on four little-know species of the genus *Zelotes* Gistel, 1848 (Araneae, Gnaphosidae). Bulletin of the British Arachnological Society 12(4): 196−200.

DI FRANCO F. & PANTINI P., 2000 − Gnaphosidae dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano) (Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 477−484.

ESYUNIN, S. L. & TUNEVA, T. K., 2020 − A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei), 6. Taxonomic remarks and new records, with description of a new species. Arthropoda Selecta 29(1): 103−120.

GARNERI G.A., 1902 − Contribuzione alla fauna sarda.

Aracnidi. Bollettino della società zoologica italiana 3 serie 2: 57−103.

GRIMM, U., 1985 − Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (NF)26: 1−318.

ISAIA M., PANTINI P., BEIKES S. & BADINO G., 2007 − Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Piemonte e della Lombardia. Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese 9: 9−161.

ISAIA M., PASCHETTA M., GOBBI M., ZAPPAROLI M., CHIARLE A. & VIGNA TAGLIANTI A., 2014 − Stand maturity affects positively ground-dwelling arthropods in a protected beech forest. Annals of Forest Science 72: 415−424.

ISAIA M., TOLVE M. & PANTINI P., 2025 − Araneae.it 2.0: the new updated version of the digital catalog of the Italian Spiders and other Arachnids (Arachnida: Araneae, Opiliones, Scorpiones, Pseudoscorpiones, Palpigradi, Solifugae). Fragmenta entomologica, Roma 57(2): 197–204.

KRITSCHER E., 1958 − Araneen aus den Picentinischen Bergen. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 6(1957−1958): 313−320.

LAMI F., BURGIO G., MAGAGNOLI S., SOMMAGGIO D., HORVÁTH R., NAGY D.D. & MASETTI A., 2023 − Ground-dwelling arthropods as biodiversity indicators in maize agroecosystems of Northern Italy. Ecological Indicators 152: 110352.

MILLER F., 1967 − Studien über die Kopulationsorgane der Spinnengattung *Zelotes*, *Micaria*, *Robertus* und *Dipoena* nebst Beschreibung einiger neuen oder unvollkommen bekannten Spinnenarten. Přírodovědné práce ústavů Československé Akademie Věd v Brně (N.S.) 1: 251−298.

NENTWIG W., BLICK T., BOSMANS R., HÄNGGI A. & KROPF C., 2025 − Spiders of Europe. Version 12.2025. Online at https://www.araneae.nmbe.ch, accessed on 16.12.2025. https://doi.org/10.24436/1.

NOFLATSCHER M.T., 1993 − Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - IV: Epigäische Spinnen am Vinschgauer Sonnenberg (Arachnida: Aranei). Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck 80: 273−294.

PANTINI P. & MAZZOLENI F., 2018 − I ragni di Calabria (Arachnida, Araneae). Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi", Bergamo 31: 11−70.

PICCHI M.S., 2020 − Spiders (Araneae) of olive groves and adjacent semi-natural habitats from central Italy. Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters 60: 1−11.

PLATNICK N.I. & DI FRANCO F., 1992 − On the relationships of the spider genus *Cybaeodes* (Araneae, Dionycha). American Museum Novitates 3053: 1−9.

PONOMAREV A.V. & SHMATKO V.Y., 2022 − A new species and new records of spiders (Aranei) in the south of European Russia. Caucasian Entomological Bulletin 18: 287−290.

ULIANA M., PANTINI P., DE SAVI L., 2016 − Prime segnalazioni di *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae, Araneidae) per il Veneto e per l'Italia settentrionale. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 41: 5−8.

WORLD SPIDER CATALOG, 2025 − World Spider Catalog. Version 26. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, accessed on 16.12.2025. doi: 10.24436/2.

Indirizzo degli autori:

Paolo Pantini
Museo Civico di Scienze Naturali
Piazza Cittadella 10, I-24129, Bergamo, Italia
email: paolo.pantini@comune.bergamo.it

Michele Caria
Via Grazia Deledda 70, I-09040, Guasila, Italia
email: otzcaria@gmail.com